

# Albania

07/09/2006

| País            | Código | Descripción                       | Pauta                        |
|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| Albania<br>2012 | BCG    | Bacilo Calmette Guérin            | al nacimiento                |
|                 | DTPe   | Difteria, tétanos y tos ferina    | 2, 4, 6, meses 2 años        |
|                 | VHB    | Hepatitis B                       | al nacimiento, 2, 4, 6 meses |
|                 | Hib    | Hemophilus influenzae             | 2, 4, 6 meses                |
|                 | SRP    | Sarampión, rubéola y paperas      | 1, 5 años                    |
|                 | Nc     | Neumococo conjugada               | 2, 4, 6 meses                |
|                 | VPO    | Polio oral                        | 2, 4, 6 meses, 2, 6 años     |
|                 | DT     | Tétanos y difteria dosis infantil | 6 años                       |
|                 | Td     | Tétanos y difteria para adultos   | 14 años                      |
|                 | TT     | Toxoide tetánico                  | Primer contacto,<br>1 mes    |

---

# Macedonia

07/09/2006

| <b>País</b>  | <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                | <b>Pauta</b>                       |
|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Antigua<br>República<br>Yugoslava<br>de<br>Macedônia<br>2012 | BCG           | Bacilo Calmette<br>Guérin         | al nacimiento, 7<br>años           |
|  | VHB           | Hepatitis B                       | Al nacimiento, 2,<br>6 meses       |
|  | DTPe          | Difteria, tétanos y<br>tos ferina | 2, 3, 5, 18 meses,<br>4 años       |
|  | Hib           | Haemophilus<br>influenzae b       | 2, 3, 5, 18 meses                  |
|  | SRP           | Sarampión, rubéola y<br>paperas   | 12 meses, 6 años                   |
|  | R             | Sarampión, rubéola y<br>paperas   | Sarampión, rubéola<br>y paperas    |
|  | VPO           | Polio oral                        | 2, 3'5, 5, 18<br>meses, 7, 14 años |
|  | HPV           | Papilomavirus                     | Mujeres de 12<br>años. 3 dosis     |
|  | Td            | Tétanos y difteria<br>de adulto   | 7, 14 años                         |
|  | TT            | Tétanos                           | 18 años                            |

# Bulgaria

07/09/2006

| <b>País</b> | <b>Código</b> | <b>Descripción</b> | <b>Pauta</b> |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|
|-------------|---------------|--------------------|--------------|

|                    |     |                                      |  |
|--------------------|-----|--------------------------------------|--|
| Bulgaria<br>nov/12 | BCG | Tuberculosis                         | RN después de 48h,<br>(7meses, 7, 11, 17<br>años si PPD neg.)                    |
|                    | DTP | Difteria, témanos<br>y tos ferina    | 2, 3, 4, 16 meses,<br>6 años   |
|                    | VHB | Hepatitis B                          | al nacimiento, 1,<br>6 meses   |
|                    | SRP | Sarampión, rubéola<br>y paperas      | 13 meses, 12 años  |
|                    | VPI | Polio inyectable                     | 2, 3, 4, 16 meses,<br>6 años   |
|                    | Hib | Haemophilus<br>influenzae tipo b     | 2, 3, 4, 16 meses  |
|                    | Td  | Témanos y difteria<br>dosis infantil | 12, 17 años. A<br>partir de los 25<br>años, dosis de<br>recuerdo cada 10<br>años |
|                    | Nc  | Neumococo<br>conjugada               | 2, 3, 4, 12 meses  |

# Serbia

07/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|      |        |             |       |

|                |      |                                   |   |
|----------------|------|-----------------------------------|---|
| Serbia<br>2012 | BCG  | Bacilo Calmette<br>Guérin         | al nacimiento   |
|                | VHB  | Hepatitis B                       | Al nacimiento, 4<br>semanas, 5 meses                    |
|                | DTPe | Difteria, tétanos y<br>tos ferina | 8, 14, 20 semanas, 18<br>meses                          |
|                | VHB  | Hepatitis B                       | al nacimiento, 1-2, 6<br>meses (en algunas<br>regiones) |
|                | Hib  | Haemophilus<br>influenzae b       | 8, 14, 20 semanas                                       |
|                | SRP  | Sarampión, rubéola y<br>paperas   | 12 meses, 7 años  |
|                | VPO  | Polio oral                        | 8, 14, 20 semanas, 18<br>meses, 7, 14 años              |
|                | Td   | Tétanos y difteria<br>de adulto   | 14 años   |
|                | DT   | Tétanos y difteria                | 7 años  |

## Montenegro

07/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|      |        |             |       |

|                    |      |   |  |
|--------------------|------|---|--|
| Montenegro<br>2012 | BCG  | Bacilo Calmette<br>Guérin                     | al nacimiento  |
|                    | DT   | Tétanos y<br>difteria dosis<br>infantil       | 6 años   |
|                    | DTPa | Difteria, tétanos<br>y tos ferina<br>acelular | 3, 4, 6 meses, 5 años<br>(en algunas regiones)                   |
|                    | VHB  | Hepatitis B                                   | al nacimiento, 1-2, 6<br>meses (en algunas<br>regiones)          |
|                    | Hib  | Haemophilus<br>influenzae b                   | 2-3, 3-5, 18 meses, 2<br>años                                    |
|                    | SRP  | Sarampión,<br>rubéola y paperas               | 18 meses, 2 años (en<br>algunas regiones)                        |
|                    | VPI* | Polio inactivada                              | 2, 4, 6 meses, 5<br>años(en algunas<br>regiones)                 |
|                    | VPO  | Polio oral                                    | 3, 4, 5-6, 18-24<br>meses, 5-7, 14 años<br>(en algunas regiones) |
|                    | Rub  | Rubéola                                       | 13 años (en algunas<br>regiones)                                 |
|                    | Td   | Tétanos y<br>difteria para<br>adultos         | 14 años (en algunas<br>regiones)                                 |
|                    | TT   | Toxoide tetánico                              | 18 años (en algunas<br>regiones)                                 |

# Malta

07/09/2006

| País            | Código  | Descripción                    | Pauta  |
|-----------------|---------|--------------------------------|--|
| Malta<br>abr/12 | BCG     | Tuberculosis                   | 12 años ( test de tuberculina - )            |
|                 | DTPa    | Difteria, tétanos y tos ferina | Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses          |
|                 | VHB     | Hepatitis B                    | 12, 13, 18 meses                             |
|                 | Hib     | Haemophilus influenzae tipo b  | Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses          |
|                 | SRP     | Sarampión, rubéola y paperas   | 13 meses, 3-4 años                           |
|                 | VP0/VPI | Polio oral/inyectable          | Desde las 6 semanas, 3, 4, 18 meses, 16 años |
|                 | Td      | Tétanos y difteria adultos     | 16 años                                      |

Programa de vacunación nacional de Malta de 0 a 16 años

---

## Aviso Legal

07/09/2006

Esta página de Internet es un servicio de la AEV; al igual que cualquier otro servicio, y a pesar de nuestros esfuerzos, es posible que la información que en ella se facilita quede

desfasada con el paso del tiempo. Nada de lo que en ella se dice debe tomarse como si fuera un consejo o una recomendación, y, por tanto, no debe considerarse como algo en que deba basarse cualquier toma de decisiones. Es importante que, en relación con su caso, usted dependa únicamente del asesoramiento y del consejo de un profesional de la atención sanitaria. La AEV -el sitio web- proporciona enlaces a sitios de interés potencial para los usuarios pero no toma responsabilidad por el contenido de cualquier sitio externo.

La información y servicios contenidos en esta web van destinados a personal sanitario y público general, y representan evaluaciones y opiniones independientes de los autores, que no necesariamente reflejan las opiniones o recomendaciones de la AEV. Se halla organizada en tres secciones, dos de ellas dirigidas específicamente a cada uno de estos usuarios: profesionales y público general, y otra sección, información general, de interés para todos los usuarios que visiten la web. Esta página Web no contiene propaganda de productos sanitarios ni de ningún otro tipo. Las entidades que patrocinan económicamente el mantenimiento de este Web sin participar en su contenido ni en su línea editorial, lo cual es decisión única y exclusiva del Comité Editorial de la misma y bajo supervisión de la Junta Directiva de la AEV.

Las fotos de los niños que aparecen en la web están publicadas con la autorización de sus padres o tutores, o en su caso son promocionales o publicitarias.

---

# Italia

07/09/2006

| País            | Código | Descripción                        | Pauta   |
|-----------------|--------|------------------------------------|---|
| Italia<br>12/14 | DTPa   | Difteria, tétanos y tos ferina     | 3, 5-6, 11-13 meses, 5-6 años                       |
|                 | VHB    | Hepatitis B                        | 3, 5-6, 11-13 meses                                 |
|                 | Hib    | Haemophilus influenzae tipo b      | 3, 5-6, 11-13 meses                                 |
|                 | VPI    | Polio inactivada                   | 3, 5-6 , 11-13 meses, 5-6 años                      |
|                 | SRP    | Sarampión, rubéola y paperas       | 13-15 meses, 5-6 años. Recaptación a los 11-18 años |
|                 | Nc7    | Neumococo conj. 7-valente          | 3, 5-6, 11-13 meses                                 |
|                 | MeC    | Meningococo C                      | 13-15 meses.<br>Recaptación a los 11-18 años        |
|                 | Tdpa   | Difteria, tétanos y tos f. adultos | 11-18 años  |
|                 | dT     | Tétanos y difteria adultos         | Recuerdo cada 10 años                               |
|                 | Var    | Varicela                           | 11-18 años 2 dosis.<br>Serología                    |
|                 | VPH    | Papilomavirus                      | Mujeres de 12 años,<br>3 dosis                      |

Calendario de vacunación de Italia (italiano)

# Monaco

07/09/2006

| País           | Código | Descripción                             | Pauta                      |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Mónaco<br>2012 | BCG    | Bacilo Calmette Guérin                  | al nacimiento              |
|                | DTPa   | Difteria, tétanos y tos ferina acelular | >= 2 meses*                |
|                | VHB    | Hepatitis B                             | >=2 meses*, 5 meses, 1 año |
|                | Hib    | Haemophilus influenzae                  | >= 2 meses*                |
|                | SRP    | Sarampión, rubéola y paperas            | 1, 3-6 años                |
|                | VPI    | Polio oral inactivada                   | >= 2 meses*                |
|                | MenC   | Meningococo C conjugada                 | 2 años                     |
|                | Np     | Neumococo de polisacaridos              | 2 meses                    |

\*DTPa, VPI, VHB y Hib se administran como vacuna hexavalente

# San Marino

07/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

|                       |      |                                 |                             |
|-----------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|
| San<br>Marino<br>2012 | DTP  | Difteria, tétanos y tos ferina  | 3, 5, 11-12 meses, 5-7 años |
|                       | VHB  | Hepatitis B                     | 3, 5, 11 meses              |
|                       | Hib  | Haemophilus influenzae tipo b   | 3, 5, 11-12 meses           |
|                       | SRP  | Sarampión, rubéola y paperas    | 15 meses, 10 años           |
|                       | VPI  | Polio inactivada                | 3, 5, 11-12 meses, 5-7 años |
|                       | HPV  | Papilomavirus                   | Mujeres de 11 años. 3 dosis |
|                       | Td   | Tétanos y difteria para adultos | 15-16 años                  |
|                       | dTpa | Tétanos, dif. y pert. acelular  | 25-26 años                  |