

# La vacuna RotaTeq vuelve a las farmacias

14/11/2010

Como ya anunciamos en nuestra web el pasado 16 de noviembre (Nota informativa AEMPS: Liberación de lotes de la Vacuna Rotateq) RotaTeq nuevamente se encuentra disponible en las oficinas de farmacia españolas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado una nota informativa (4 de noviembre de 2010) en la que señala que ha revisado sus recomendaciones previas y ha decidido permitir de nuevo la liberación de lotes de la vacuna RotaTeq® una vez concluida la investigación iniciada el pasado junio con motivo de la detección de fragmentos de ADN de virus porcinos (circovirus) en la vacuna.

La decisión adoptada por la AEMPS se basa en el informe de la Agencia Europea de Medicamentos, emitido a finales de septiembre, en el que confirmaba que los fragmentos de circovirus porcino en la vacuna RotaTeq no representan un riesgo para la salud pública y que ésta puede continuar comercializándose. Respecto a la otra marca comercializada, Rotarix, se mantiene la retirada preventiva. En realidad, nunca se llegó a prohibir las vacunas por completo, ya que quedaban dosis disponibles en las farmacias con las que completar las vacunaciones ya iniciadas. Lo que no se recomendaba era iniciar nuevas vacunaciones a los bebés, y se bloqueó la entrada de más vacunas hasta que avanzaran las investigaciones.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

---

# Descenso en la vacunación contra la gripe

14/11/2010

La campaña de vacunación contra la gripe estacional de este año ha bajado considerablemente. Algunas causas apuntan a la falta de confianza porque esta vacuna incluye la cepa del virus AH1N1 (causante de la gripe A). Además, el revuelo de la temporada pasada por la gripe A, que finalmente no tuvo la incidencia esperada, puede que haya generado cierto relajamiento en la vacunación de este año. Los centros de salud han administrado menos dosis que la temporada pasada. Los primeros resultados de la campaña de vacunación contra la gripe, que arrancó a principios de octubre, han sido recibidos con preocupación. «Hay una relajación en la población después de que el año pasado los efectos de la epidemia de gripe A fuesen menores de los inicialmente previstos», explica Francisco García Ruiz, director general de Salud Pública de Murcia. José Antonio Navarro, jefe de Prevención y Vacunas de la Consejería, confirma este diagnóstico. «Se ha perdido el respeto a la gripe», resume. Pero «no hay que bajar la guardia. Este año, la vacuna inmuniza tanto contra las cepas consideradas estacionales como contra el nuevo virus A H1N1.

[\[Más información\]](#) [Más información] [Más información] [\[Más información\]](#) [Más información]

---

## Galicia incorporará la vacuna

# frente al neumococo al calendario infantil

14/11/2010

La vacuna frente al neumococo se incorporará al calendario infantil gratuito. Fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció esta incorporación "de forma inminente y progresiva para que todos los niños gallegos puedan acceder a ella". El anuncio lo hizo durante su participación en el II Taller Pediátrico Compostelano, en Santiago, y que reúne a 250 especialistas a nivel internacional.

[Más información] [\[Más información\]](#)

---

## Evidencias en contra de la asociación vacunas y autismo

14/11/2010

Nuevo folleto de IAC (Immunization Action Coalition), dirigido a los profesionales sanitarios en el que se presentan evidencias sobre la falta de relación entre autismo y vacunas: "Evidence Shows Vaccines Unrelated to Autism," El documento de dos páginas aporta las evidencias científicas que refutan la relación entre autismo y vacunas, aportando además información sobre el estado actual del conocimiento sobre las causas del autismo. La sección IAC's Handouts for Patients and Staff de su web contiene aproximadamente 250 folletos en inglés. Encontrándose traducciones de varios de ellos.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

---

# Las vacunas no se asocian con riesgo de artritis reumatoide

14/11/2010

Según una reciente comunicación presentada en el American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting, celebrada en Atlanta, por investigadores del Karolinska Institutet de Suecia, las vacunas comunes a administrar en adultos no se asocian con un riesgo incrementado de padecimiento de artritis reumatoidea. La investigación que soporta la información comenzó en 1966 y ha incluido datos de 8.000 individuos. En el grupo de vacunados los investigadores compararon a 1.998 sujetos con artritis reumatoidea que habían sido vacunados en los 5 años anteriores al inicio de la enfermedad con 2.252 participantes con artritis que no habían sido vacunados previamente. Comprobaron que no existía asociación entre vacunación y el desarrollo de artritis reumatoidea, así como tampoco la había entre ninguna vacuna en especial y el riesgo de padecer dicha enfermedad. La vacunación tampoco incrementó el riesgo entre fumadores portadores de los alelos HLA-DRB1 SE, que sí son factores de riesgo establecidos de padecimiento de la enfermedad.

[\[Más información\]](#)

---

# Epidemia de cólera en Haití

14/11/2010

La epidemia de cólera de Haití va en aumento de modo que el

Gobierno ha cifrado en 1.034 los fallecimientos. El número de individuos tratados por síntomas coléricos asciende a 16.799. Los trabajadores de las Naciones Unidas han comentado que los suministros llegan muy despacio. Los análisis genéticos iniciales apuntan a que la enfermedad llegó al país mediante comida contaminada, agua o fue importada por alguna persona. Mientras tanto la República Dominicana ha confirmado el primer caso de cólera en un haitiano que volvía de su país.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

---

## **Melilla modifica su calendario de vacunaciones**

14/11/2010

El Comité Asesor de Vacunas de la Ciudad de Melilla ha acordado realizar cinco modificaciones en el calendario vacunal infantil de cara al año que viene. La consejera de Bienestar Social y Sanidad, tras subrayar que el de Melilla es el calendario vacunal más completo del país, explicó que a partir de ahora se introducirá una segunda dosis de la varicela a los 24 meses. De igual modo, se ha acordado introducir la segunda dosis a los 10 años un mes después de ponerse la primera dosis. La tercera novedad reside en la vacuna de la difteria, el tétanos y la tos ferina, que se sustituye por una de menor carga para que evitar reacción. Además de suprimir la vacuna contra la hepatitis A+B que se ponía a los 13 años, el año que viene se va a realizar un barrido en la población de la vacuna contra la meningitis C, ya que los niños y jóvenes de entre 11 y 20 años tan sólo se encuentran vacunados con una dosis.

[\[Más información\]](#)

---

# **Vacunas contra el VPH se relacionan con menos verrugas genitales**

14/11/2010

Los casos de verrugas genitales han descendido 59 por ciento en las mujeres jóvenes y 28 por ciento en los hombres heterosexuales en Australia desde que se lanzó un programa de vacunación financiado por el gobierno contra el virus del papiloma humano (VPH) para todas las niñas y mujeres de 12 a 26 años de edad en 2007, según muestra un estudio reciente. Los VPH tipos 6 y 11 causan el 90 por ciento de todos los casos de verrugas genitales. La vacuna contra el VPH (Gardasil) utilizada en el programa se dirige a ambos tipos de VPH. Para 2009, el 65.1 por ciento de todas las residentes elegibles de Australia habían recibido la vacuna. El estudio aparece en la edición en línea del 8 de noviembre de la revista *The Lancet Infectious Diseases*.

[\[Más información\]](#)

---

## **Una nueva vacuna de la malaria en África puede estar**

# Lista para 2013

14/11/2010

Autoridades africanas de la salud comenzarán a estudiar la mejor forma de introducir la nueva vacuna contra la malaria dentro de unos dos años, tras casi 25 de investigaciones. La fase tres de fabricación comenzó con la vacunación de 16.000 niños y niñas de siete países africanos. El producto podría estar listo para su uso masivo en 2013. La vacuna RTS,S se dará a los sectores más vulnerables de la población. Se inocularán bebés de entre seis y 12 semanas y de entre cinco y 17 meses para fortalecer su resistencia a la enfermedad hasta que cumplan los cinco años. La Iniciativa para una Vacuna contra la Malaria trabaja con el laboratorio GlaxoSmithkline para crear el producto que puede cambiar de forma radical la situación en África. Las pruebas realizadas hasta ahora en Burkina Faso, Gabón y Tanzania muestran que la vacuna tiene más de 50 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad, señaló David Poland, oficial de comunicaciones del no gubernamental Programa sobre Tecnología Apropiada en Salud, que gestiona la Iniciativa para una Vacuna contra la Malaria.

[Más información]

---

## Epidemia de polio en Congo

14/11/2010

La World Health Organization ha comunicado que la epidemia de poliomyelitis de la República del Congo ha provocado 201 casos de parálisis y 104 muertes en solamente dos semanas. La WHO, UNICEF y el U.S. Centers for Disease Control and Prevention ayudarán al gobierno a administrar 3 dosis de la vacuna oral para toda la población del país. El director del programa

global de erradicación ha comentado que está por ver si se contendrá la epidemia como resultado de las campañas de vacunación en Africa Central acaecidas en los últimos años.

[\[Más información\]](#) [Más información]