

# **Vacuna de triple vírica en tratamiento con Interferón y vacuna de hepatitis B en hepatitis autoinmune**

29/12/2010

Palabra clave: Seguridad vacunal, Hepatitis B

Respuesta de José Antonio Navarro (29 de diciembre de 2010)

---

# **Actitud ante sanitaria vacunada de hepatitis b, sin documentación y con títulos nulos de antiHBs**

29/12/2010

Palabra clave: Hepatitis B

Respuesta de Pedro José Bernal (28 de diciembre de 2010)

---

# **Decoloración de extremidades**

# **tras vacuna DTPa**

29/12/2010

Palabra clave: Seguridad vacunal

Respuesta de José Antonio Navarro (27 de diciembre de 2010)

---

# **Títulos antirreubeólicos negativos tras dosis de vacuna**

29/12/2010

Palabra clave: Sarampión, Rubéola y Paratoditis

Respuesta de José María Bayas (21 de diciembre de 2010)

---

# **Excreción de virus vacunal tras inmunización con vacuna antisarampionosa**

29/12/2010

Palabra clave: Sarampión, Rubéola y Paratoditis

Respuesta de José Antonio Navarro (18 de diciembre de 2010)

---

# **Vacunación de hepatitis A en menores al viajar a sus países de origen**

29/12/2010

Palabra clave: Viajes Internacionales, Hepatitis A

Respuesta de José Antonio Navarro (17 de diciembre de 2010)

---

# **Booster de prevenir 13 tras primovacunación con synflorix**

29/12/2010

Palabra clave: Neumococo

Respuesta de José María Corretger (16 de diciembre de 2010)

---

# **Consejo médico mejora vacunación de embarazadas contra la gripe**

29/12/2010

Cerca del doble de las embarazadas que habitualmente se vacuna contra la gripe recibió la inmunización el año pasado, durante la pandemia de influenza H1N1, fundamentalmente porque los médicos las instaron a hacerlo, dijeron investigadores del

Gobierno estadounidense. Con todo, sólo alrededor de la mitad de las mujeres embarazadas durante la temporada de gripe se vacunó, aún cuando son mucho más propensas a enfermar gravemente, morir o perder a sus bebés si se infectan con la influenza, revelaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Irónicamente, muchas de las mujeres que no se vacunaron dijo que temían por su propia salud o la de sus bebés, indicaron los CDC.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC recomiendan fuertemente que las mujeres embarazadas reciban las vacunas contra la gripe para protegerse ellas y a sus bebés.

En octubre, un estudio confirmó que los bebés recién nacidos cuyas madres se habían vacunado contra la gripe durante la gestación eran menos propensos a contraer gripe o a ingresar a hospitales por una enfermedad respiratoria en los primeros seis meses de vida.

[\[Más información\]](#)

---

## **Vigilancia de la gripe. Temporada 2010-2011**

29/12/2010

En la semana 51/2010 (del 19 al 25 de diciembre de 2010) la actividad gripal es creciente en todas las redes centinela, con excepción de la Comunidad Valenciana y Melilla. Además de Asturias, Extremadura y La Rioja, esta semana se alcanzan valores de incidencias de gripe iguales o superiores al valor umbral de la temporada 2010-2011 en Aragón, Castilla La

Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco. Esta tendencia creciente se asocia a una circulación generalizada de virus gripales, con predominio de AH1N1, en la mayoría del territorio sujeto a vigilancia, señalándose un nivel de difusión de la enfermedad esporádico en dos redes, local en seis y nula en las cinco restantes. El nivel de intensidad de la actividad gripal es medio en siete redes centinela y baja en las restantes.

La incidencia de la enfermedad en España sobrepasa por primera vez el valor umbral de esta temporada, con una tasa notificada de gripe es de 82,62 casos por 100.000 habitantes, y por segunda semana consecutiva la tasa global experimenta un aumento significativo con respecto la registrada en la semana previa (razón de tasas 2,06, IC 95% 1,80-2,37). Desde el inicio de la temporada 2010-2011 se han notificado 71 casos graves hospitalizados confirmados de gripe.

En cuanto a Europa, seis países (Bélgica, Portugal, España, Francia, Estonia y Reino Unido, informaban de una tendencia creciente de media intensidad. De los 642 virus aislados en esta semana 420 (65%) fueron tipo A and 222 (35%) tipo B. De los virus que fueron subtipados, 302 (97%) fueron (H1N1) 2009 y 10 (3%) A(H3).

[Más información] [\[Más información\]](#)

---

## **Aumentan los casos de gripe en Reino Unido**

29/12/2010

El número de casos de gripe en Inglaterra y Gales ha aumentado un 44,9% en la pasada semana según datos del Royal College of

General Practitioners. En la semana que finalizó el 26 de diciembre se declararon 124,4 casos por 100.000 habitantes cuando en la previa fueron 85,8/100.000. Según portavoces del Departamento de Salud estos datos son los que se esperarían durante una temporada gripal. Por otra parte los expertos no están seguros de porqué el incremento de casos se está observando en diciembre y no en enero y esperan que el pico se alcance esta o la próxima semana.

Los fallecimientos por gripe han aumentado de 10 a 27 de los que 24 han sido causados por la cepa A/H1N1. Desde octubre de 2010 han fallecido 17 personas en el Reino Unido como consecuencia de la gripe, la mayoría por la cepa pandémica A/H1N1. Existe la preocupación de que haya una importante crisis debida a la gripe a lo largo de este invierno ya que pocos ciudadanos de riesgo han recibido la vacuna.

Hasta la fecha solo se han vacunado un 40% según la Health Protection Agency. La British Medical Association quiere que el gobierno lance una campaña publicitaria para incrementar las coberturas de vacunación.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)