

¿Qué pasaría si no nos vacunáramos?

27/04/2012

Salud Pública dice que así se evita que los casos de enfermedades como la tos ferina, el sarampión o las paperas vuelvan a contarse por miles. Las vacunas protegen al 99% de los recién nacidos de la provincia. La vacuna antigripal ha permitido pasar de 35.700 a 3.500 casos. La primera vacuna de la historia fue, en 1796, la de la viruela. Sin embargo, en la provincia de Albacete el siglo de las vacunas fue el XX y la fecha clave, 1989, año en el que se estableció el primer calendario oficial de vacunaciones, es decir, los 'antídotos' gratuitos que el sistema público de salud recomendaba para todos los niños. El paso de los años ha demostrado que estos fármacos, que hoy se administran al 99% de los recién nacidos albaceteños, han dejado en cifras testimoniales enfermedades tan comunes en los años ochenta como el sarampión o la tos ferina.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Alianza GAVI, cerca de acuerdo sobre vacuna frente a VPH

27/04/2012

El grupo internacional de vacunas conocido como Alianza GAVI está avanzando en un acuerdo de precio con los dos laboratorios que fabrican vacunas para prevenir el cáncer de

cuello de útero, lo que podría significar el suministro de millones de dosis a precio reducido en las naciones en desarrollo. GAVI informó que si el acuerdo -que cubriría las vacunas de Merck y GlaxoSmithKline- se cierra al precio correcto podría tener un impacto enorme en la salud de millones de mujeres de los países más pobres del mundo. Las vacunas Gardasil de Merck y Cervarix de GSK son las únicas dos inmunizaciones aprobadas en el mundo diseñadas para proteger contra el virus del papiloma humano (VPH), causante de la mayoría de los cánceres cervicales o de cuello de útero.

[\[Más información\]](#)

Eficacia de vacuna antineumocócica 13 valente

27/04/2012

Desde la introducción de la vacuna antineumocócica de 13 serotipos en los Estados Unidos las tasas de enfermedad invasora han disminuido en niños y en adultos especialmente en lo referente a los serotipos 19A y 7F según los datos presentados por los CDC en la 1ª Conferencia Nacional de Vacunación. En los menores de dos años el efecto directo ha producido una disminución en las tasas globales mientras que para los de dos a cuatro años el descenso ha sido global y especialmente en las debidas al serotipo 19A en el último trimestre de 2011 bien por efecto directo o indirecto. Para los mayores de 18 años descendieron las tasas globales en el último trimestre de 2011 especialmente debido a los descensos de los tipos 7F y 19A. Por otra parte no se ha observado enfermedad por reemplazo por serotipos no vacunales ni en niños ni en adultos.

Seguridad de la vacuna frente a VPH

27/04/2012

Las jóvenes es más probable que reporten efectos adversos tras la recepción de la vacuna tetravalente frente a papilomavirus humano que las mujeres adultas, aunque estos efectos adversos no son graves. Estos datos han sido publicados por investigadores de los CDC en el Journal of Women's Health, mediante encuestas a 899 mujeres de 11 a 26 años en el año 2008. El dolor postvacunal fue declarado por 84% de niñas de 11 a 12 años mientras que lo declaró el 74% de las mujeres de 18 a 26 años.

[\[Más información\]](#)

Las claves del éxito de una vacuna contra el sida

27/04/2012

En 2009, se publicaron los primeros resultados positivos de una vacuna contra el VIH. RV144 disminuyó el riesgo de infección un 31,2%, un resultado modesto pero que dio por primera vez esperanza en la búsqueda de una inmunización contra el virus del sida. Tras dos años de análisis, un grupo

de investigadores publica los mecanismos inmunes que hicieron que la vacuna fuera eficaz en algunos voluntarios y que fracasara en otros. "Estudiando a aquellos que se infectaron [con el VIH] en comparación con los que no, creemos haber encontrado claves muy importantes de cómo la vacuna RV144 podría haber funcionado", explica Barton Haynes, de la Duke University, quién lideró las investigaciones publicadas ahora en The New England Journal of Medicine.

[\[Más información\]](#)

Murcia adelanta la segunda dosis de la vacuna del sarampión

27/04/2012

El director general de Salud Pública, Francisco José García, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la Consejería de Sanidad ha decidido adelantar en los colegios la segunda dosis de la vacuna del sarampión a los tres años, cuando se administra a los seis, ante un brote de la enfermedad en la pedanía murciana de Beniaján. Con esto, apuntó el director general de Salud Pública, "esperamos incrementar las defensas de estos niños", aunque consideran que con la primera vacuna "ya se adquieren unos niveles importantes de defensa".

[\[Más información\]](#)

Los casos de varicela descienden casi un 40% en Galicia en solo un año

27/04/2012

Los casos de varicela descendieron un 38% en la comunidad gallega en solo un año al pasar de los 8.456 afectados en 2009, a los 5.270 de 2010, según los últimos datos de la Dirección Xeral de Saúde Pública, dependiente de la Consellería de Sanidade. La caída de contagios llega justo después de que Galicia registrase un repunte de esta enfermedad -solo en la provincia de A Coruña, los casos aumentaron un 30% entre 2008 y 2009-. Los pediatras gallegos achacan este descenso a que cada vez hay más padres que deciden vacunar a sus hijos contra esta patología, pese a no estar financiada por el Sergas y tener que pagar unos 82 euros por el tratamiento completo. "Lo habitual es que la varicela sea una patología leve, pero en ocasiones tiene graves complicaciones", sostiene el presidente de la Sociedad Gallega de Pediatría, Juan Sánchez Lastres, quien aboga por vacunar a los pequeños a los 15 meses y a los tres años.

[\[Más información\]](#)

Aumenta el incumplimiento de la vacunación frente a VPH

27/04/2012

La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) ha advertido de que, a pesar de que la

cobertura de vacunación de la población española contra el cáncer de cérvix es muy alta, en los últimos años se ha producido un mayor incumplimiento de los calendarios oficiales, relacionado con algunas tendencias antivacunación. Este hecho responde al incremento demográfico y al aumento de ciudadanos inmigrantes de países en vías de desarrollo, que mantienen esquemas de vacunación diferentes y situaciones de ilegalidad administrativa que dificultan el control sanitario, señalan desde la SEPEAP.

[\[Más información\]](#)

Vacunación inadvertida de fiebre amarilla y tifoidea durante el embarazo

27/04/2012

Palabra clave: Situaciones Especiales, Viajes Internacionales
Respuesta de José Antonio Navarro (25 de abril de 2012)

Semana Europea de la Vacunación

27/04/2012

La semana del 23 al 29 abril de 2012 se celebra la Semana Europea de la Vacunación, promovida por la OMS. Su objetivo es difundir el mensaje de que las vacunas previenen y protegen.

Además son seguras y evitan complicaciones graves de las enfermedades frente a las que nos defienden, como se puede observar en este documento del [Ministerio de Sanidad y Política Social](#).

Se propugnan mensajes claros y concisos para informar y formar sobre la inmunización y su importancia.

Este video nos ilustra sobre la importancia de la vacunación: