

Vacuna antigripal y enfermedad coronaria

27/11/2012

Un nuevo estudio muestra que la vacuna antigripal protege frente a los ataques cardíacos según un estudio llevado a cabo en el Women's College Hospital de la Universidad de Toronto. Los investigadores, tras estudiar a más de 3.200 pacientes entre 1994 y 2008, encontraron que aquellos que recibieron la vacuna redujeron el riesgo de ataques coronarios a la mitad durante un año de seguimiento. Los motivos que podrían explicar estos hallazgos podrían residir en cuanto la vacuna podría evitar el proceso inflamatorio que siempre acompaña a la enfermedad.

[\[Más información\]](#)

Difusión de información sobre los síntomas de la meningitis

27/11/2012

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria colaborará con la Fundación Irene Megías en la difusión de información a los ciudadanos sobre los síntomas de la meningitis. Así se lo ha trasladado la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Fundación, Jorge Megías, y el director regional en Cantabria de la entidad, Santiago García. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Fundación Irene Megias organizarán una campaña conjunta, a la que van a

pedir que se sume el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, para distribuir a través de las oficinas de farmacia material divulgativo sobre los síntomas de esta enfermedad para facilitar su rápida detección. Además de informar sobre la enfermedad, sus síntomas y signos y la necesidad de su tratamiento precoz, se recordará la importancia de la vacunación infantil frente al meningococo C, incluida en el calendario oficial de la comunidad autónoma. Además, los facultativos de Atención Primaria también podrán distribuir esta información a sus pacientes en los centros de salud, en los casos que estimen oportuno, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

[Más información]

Vacunación con Gardasil en enfermos celiacos

27/11/2012

Palabra clave: Papilomavirus humano

Respuesta de José Antonio Navarro (26 de Noviembre de 2012)

**Pauta de vacunación
antineumocócica 2+1 y**

protección comunitaria

27/11/2012

Palabra clave: Neumococo

Respuesta de José Antonio Navarro (15 de noviembre de 2012)

Administración simultánea de vacunas atenuadas

27/11/2012

Palabra clave: Administración y logística vacunal

Respuesta de José Antonio Navarro (05 de Noviembre de 2012)

Campaña de vacunación antigripal

27/11/2012

Para proteger a los pacientes, «todos los trabajadores de salud deben vacunarse contra la gripe». "Cada temporada, el 20% de los trabajadores de la salud padece gripe y muchos de ellos pueden diseminar el virus a los pacientes. Ya es hora de que todas las personas que trabajan en una institución de atención de salud se vacunen", señala un editorial del Canadian Medical Association Journal. En Canadá, cada año hay aproximadamente 20.000 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y se calcula que entre 4.000-8.000 muertes pueden ser atribuidas a la enfermedad. Sin embargo, el 55% de los médicos

no se vacuna contra la gripe y pone a los pacientes en riesgo de enfermedad y muerte. El editorial sostiene que la vacunación contra la gripe para los trabajadores de salud debe ser obligatoria, aunque podría haber excepciones por razones médicas o religiosas. "Se necesita una tasa de vacunación por encima del 90% para prevenir los brotes en los hospitales".

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)
[\[Más información\]](#)

Desfinanciación la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente en Madrid

27/11/2012

Tras la desfinanciación de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente por parte de la Comunidad de Madrid, "probablemente se pierda" la reducción de la enfermedad por neumococo en todas sus formas conseguida en los últimos años, lo que aumentará su incidencia. Así lo han afirmado los especialistas en la reunión 'Un nuevo reto en la prevención de la enfermedad neumocócica en la Comunidad de Madrid', que ha organizado Pfizer en la capital, a la vez que han añadido que se perderá la inmunidad de grupo existente en esta comunidad. Para ello, se han valido de los datos del estudio 'Heracles', que se ha desarrollado en esta comunidad autónoma.

[\[Más información\]](#)

Recomendaciones ECDC para vacunación antigripal en niños y embarazadas

27/11/2012

El ECDC acaba de publicar un “consejo científico” acerca de la vacunación antigripal en niños menores de 18 años y en embarazadas, basado en una revisión sistemática de la literatura y en las opiniones de expertos independientes, que no suponen unas recomendaciones sino una guía que ayude a los Estados Miembros a producir sus propias recomendaciones. Elabora cuatro apartados con pros y contras de: a) vacunación universal de niños de 6 meses a 18 años, b) vacunación universal de niños de 6 meses a 4 años, c) vacunación universal de niños de 6 meses a 18 años con factores de riesgo, y d) vacunación antigripal anual a la embarazada sin contraindicaciones.

[\[Más información\]](#)

Indemnización por efectos adversos de la vacuna de la gripe

27/11/2012

El Servicio Catalán de Salud deberá indemnizar a José Juan

S.A. con 468.699 euros porque la vacuna de la gripe le produjo un raro síndrome como consecuencia del cual quedó inválido en un 85 % de su cuerpo, según una sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado 19 de octubre. La sentencia establece que "el daño causado no dimana" de las "técnicas sanitarias" aplicadas por el Servicio Catalán de Salud, que fueron las conocidas por la ciencia y "razonablemente disponibles en el momento", es decir, que no hubo mala praxis médica. Además, establece también que no hubo una mala información al paciente, dado que el síndrome que le afectó, como consecuencia de la vacuna, es tan raro que no era razonable esperar que se le informara de esa lejana posibilidad por parte de los médicos que le administraron la vacuna. El reclamante, que quedó inválido por un desorden neurológico, por un riesgo propio del medicamento o por una excepcional reacción autoinmune, pero en cualquier caso como consecuencia de la administración de la vacuna, "no tiene el deber jurídico de soportar de manera individual" esta carga social "que ha de ser compartida por el conjunto de la sociedad", dice el Supremo.

[Más información]

Vacunación contra la tos ferina en el embarazo

27/11/2012

El ACIP en su reunión de octubre 2012 ha recomendado por aplastante mayoría de sus miembros que todas las embarazadas reciban la vacuna dTpa en cada uno de los embarazos. Por otra parte también ha aprobado que si las madres no reciben la vacuna durante la gestación, lo hagan en el postparto

inmediato antes de abandonar el hospital. Con la vacunación materna se consigue que los anticuerpos generados por la madre pasen transplacentariamente al recién nacido proporcionándole protección desde el nacimiento. También ha recomendado el uso de la vacuna de GlaxoSmithKline, MenHibrix, que contiene *H. influenzae* y polisacáridos capsulares de meningococo C e Y, en niños de riesgo de hasta 18 años.

[\[Más información\]](#)