

Vacunarse de la gripe evita un 80 por ciento de las hospitalizaciones en los diabéticos

27/10/2012

La vacunación puede evitar hasta cerca de un 80 por ciento de las hospitalizaciones derivadas de las consecuencias de la gripe en las personas con diabetes. Así lo han constatado los especialistas de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y del Grupo de Estudio de la Gripe (GEG), que han hecho hincapié en la importancia de la inmunización antigripal en este grupo de riesgo para que pueda protegerse de la infección y de sus complicaciones. La gripe puede alterar los niveles de glucosa en las personas con diabetes ya que en algunas ocasiones se acompaña de vómitos y diarreas, y de ahí la necesidad de incentivar más la inmunización entre este colectivo que no obstante es uno de los grupos de riesgo más concienciados con la vacunación. En la pasada campaña se vacunaron el 76,5% de los diabéticos mayores de 65 años y el 47,5% de los menores de 65. Según los especialistas, en la diabetes se da un círculo vicioso en el que la hiperglucemia debilita las funciones inmunes del organismo y aumenta por tanto la posibilidad de infección. Pero, al mismo tiempo, la infección puede incrementar la glucemia en los pacientes.

[Más información]

La vacuna del VPH no aumenta las ETS

27/10/2012

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Emory en Atlanta (EE.UU.) ha demostrado que la administración de la vacuna no aumentó entre las adolescentes la aparición de enfermedades de transmisión sexual (ETS) o el número de embarazos. El estudio, publicado en *Pediatrics*, demuestra que la preocupación de los padres a que sus hijas puedan, tras recibir la vacuna, aumentar sus relaciones sexuales de riesgo, podría ser infundada. «Algunos padres han expresado una preocupación», ha explicado Saad Omer, uno de los investigadores de enfermedades infecciosas y vacunas de la Universidad que desarrolló el estudio. «Los padres pueden estar tranquilos por lo menos sobre la base de la evidencia de que las jóvenes que reciben vacunas no mostraron signos de aumento en los resultados clínicos de actividad sexual», ha añadido.

[\[Más información\]](#)

Afectadas por la vacuna contra el virus del papiloma

27/10/2012

La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) ha pedido al Ministerio de Sanidad la retirada del tratamiento contra el virus del papiloma humano (VPH) del calendario vacunal de las niñas y la creación de un fondo de compensación para las personas que sufren efectos secundarios. El

coordinador del Grupo Español de Consenso sobre Vacunas del Virus del Papiloma Humano, Javier Cortés, ha asegurado que "ningún efecto adverso grave" que ha aparecido en una persona vacunada contra el virus del papiloma humano, incluyendo los casos de fallecimiento, ha estado relacionado "causalmente" con la inmunización y que son "asociaciones temporales". "Respeto la libertad de expresión que tienen estos ciudadanos", ha explicado Cortés, a la par que ha transmitido el convencimiento que tiene la comunidad científica internacional de que se trata de una inmunización "altamente eficaz altamente segura y altamente recomendable". "Nadie en la comunidad científica internacional se está planteando retirar la vacuna de los calendarios. Estamos convencidos de que la vacunación contra el virus del papiloma humano es un paso adelante en prevención de un volumen de enfermedad, que amenaza seriamente a la salud de las mujeres y a los hombres", ha señalado. Recientemente, 15 asociaciones médicas y científicas salieron en defensa de la eficacia y seguridad de la inmunización, tras el reciente fallecimiento de una joven asturiana, acaecida después de haber sido vacunada frente al VPH, y que está siendo investigado por las Autoridades Sanitarias del Principado de Asturias y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

[Más información] [\[Más información\]](#)

**Vacunación de embarazadas
contra tos ferina en Reino**

Unido

27/10/2012

El Chief Medical Officer del Reino Unido ha puesto en marcha el día 1 de octubre un programa temporal de vacunación frente a la tos ferina en embarazadas entre las 28 y 38 semanas de gestación a la vista del importante incremento de la incidencia de la enfermedad en los últimos años que ha provocado 4791 casos en lo que va de año con nueve fallecimientos en lactantes por debajo de los dos meses, siguiendo los consejos del Joint Committee on Vaccines and Immunization.

[\[Más información\]](#)

Recomendaciones OMS para la campaña antigripal en Hemisferio Sur

27/10/2012

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las vacunas antigripales para el Hemisferio Sur para 2013 contengan las mismas tres cepas que las de 2012-2013 del Hemisferio Norte. Por otra parte sus expertos no están excesivamente preocupados por la diseminación global de la variante de origen porcino H3N2 que se han aislado en los Estados Unidos, ya que aunque se han registrado más de 300 casos en los últimos meses, casi todos ellos habían tenido contacto con cerdos y tienen una muy limitada capacidad de transmisión interhumana.

[\[Más información\]](#)

Serología negativa a rubeola en mujer en edad fértil tras vacunación

27/10/2012

Palabra clave: Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Respuesta de José Antonio Navarro (8 de Octubre de 2012)

Inmunoprofilaxis antirrábica tras mordedura de perro

27/10/2012

Palabra clave: Rabia

Respuesta de José Antonio Navarro (18 de septiembre de 2012)

Seronegatividad tras dos dosis de vacuna de varicela

27/10/2012

Palabra clave: Varicela

Respuesta de José Antonio Navarro (30 de agosto de 2012)

Intercambio de vacunas frente al virus del papiloma humano

27/10/2012

Palabra clave: Papilomavirus humano

Respuesta de José Antonio Navarro (29 de Agosto de 2012)

Protección frente a la hepatitis A con una dosis de vacuna

27/10/2012

Palabra clave: Hepatitis A

Respuesta de José Antonio Navarro (23 de agosto de 2012)