

# **CDC publica recomendaciones provisionales sobre la vacunación contra la gripe**

27/05/2013

CDC publicó el documento “Prevención y control de la influenza con vacunas: recomendaciones provisionales del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), 2013”, en la edición de 10 de mayo de MMWR. Cuatro nuevos productos de vacunas antigripales estarán disponibles junto a los productos previamente aprobados para la temporada de influenza 2013-2014. Este informe resume las recomendaciones para el uso de vacunas contra la influenza aprobados por ACIP el 21 de febrero de 2013. El artículo incluye un enlace a una tabla de todas las vacunas contra la gripe que actualmente tienen licencia y se espera que esté disponible para la temporada 2013-14, y sus indicaciones aprobadas según edad.

[\[Más información\]](#)

---

# **AAP reafirma la política con respecto a los padres que rechazan la vacunación de sus hijos**

27/05/2013

El 29 de abril, la Academia Americana de Pediatría (AAP) publicó “Reafirmación: Responder a padres que rechazan la

inmunización de sus hijos". El documento incluye un cambio en la redacción. La declaración de política original fue publicada el 1 de mayo de 2005.

[\[Más información\]](#)

---

## **Vacuna de rotavirus y riesgo de convulsiones febriles**

27/05/2013

Una pauta completa de vacunación frente a rotavirus se asocia con una reducción moderada del riesgo de convulsiones que precisen de hospitalización en el año posterior, comparado con los niños no vacunados, según los resultados presentados en la reunión de la Pediatric Academic Societies Annual Meeting en Washington, debido a que las infecciones por ese virus producen viremia con potencial de enfermedad sistémica incluido su detección en líquido cefalorraquídeo. Para llegar a esa conclusión se evaluó retrospectivamente una cohorte de niños nacidos con posterioridad a febrero 2006 y que estaban asociados al Vaccine Safety Datalink desde 30 días hasta un año tras recibir la última dosis de vacuna, comprobándose que los vacunados tuvieron 1383 episodios de convulsiones por 100.000 personas/año frente a 1502 en no vacunados con un riesgo relativo significativo de 0.88. La vacunación se asoció, por tanto, con una reducción aproximada del riesgo de hospitalizaciones que precisaron ingreso.

[\[Más información\]](#)

---

# **Vacuna antigripal en niños con enfermedad inflamatoria intestinal**

27/05/2013

Los pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en medicación inmunosupresora pueden recibir la vacuna antigripal sin incremento de efectos adversos respecto de los niños sanos. Estos hallazgos provienen de un estudio con 4916 niños de 2 a 18 años diagnosticados de EII entre 1999 y 2010 seguidos hasta los 19 años apareados con 21686 controles vacunados en el que mediante un análisis de serie de casos autocontrolados se evaluó el efecto de la vacunación en el riesgo de hospitalización o de visitas a urgencias. A pesar de los hallazgos las coberturas de vacunación en estos pacientes permanecen muy bajas.

[\[Más información\]](#)

---

# **No vacunación por motivos religiosos en Estados Unidos**

27/05/2013

Las escuelas privadas de los Estados Unidos tienen mayores tasas de exenciones vacunales por motivos religiosos que las públicas según un informe presentado en la reunión de la Pediatric Academic Societies Annual Meeting. En el estudio se

comprobó que las exenciones religiosas en los colegios privados del estado de Nueva York eran del 0.52% mientras que en las públicas eran del 0.25% y además se habían incrementado del 0.3% al 0.8% entre 2008 y 2011. Este tipo de objeciones en el global de los Estados Unidos han pasado del 0.75% al 1.07% durante ese periodo.

[\[Más información\]](#)

---

## **Vacuna frente a VPH para países pobres**

27/05/2013

En un intento de llegar a más niñas y mujeres jóvenes con la vacunación frente a VPH, tanto GSK como Merck han anunciado que van a reducir sus precios de la vacuna a menos de 5 dólares por dosis, lo que ha sido calificado por la OMS como "un gran paso para las mujeres". Esta rebaja la ha negociado la Global Alliance for Vaccines and Immunization y será efectiva para las vacunas a emplear en Kenia, Ghana, Laos y Madagascar. La vacuna Gardasil costará 4.50 dólares que es el equivalente a su precio de fabricación sin tener en cuenta las inversiones en investigación y marketing, mientras que Cervarix costará 4.60 euros. Se estima que para 2020 unas 30 millones de chicas de 40 países recibirán estas vacunas e incluso a precios más bajos.

[\[Más información\]](#)

---

# Vuelve la tos ferina

27/05/2013

Un equipo de investigadores ha llegado a la conclusión de que ninguna de las explicaciones principales del resurgimiento de la tos ferina, incluida la que lo vincula a las vacunas, se sustenta en pruebas, según un artículo que publica la revista *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Según el artículo en PNAS, muchos expertos sospechan que este resurgimiento alarmante se debe a las vacunas infantiles ineficaces. Un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y el Ministerio de Salud Pública de Tailandia, ha llegado a la conclusión de que ninguno de esos mecanismos propuestos como explicación del resurgimiento de la tos ferina se sustenta en la mejor evidencia disponible.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

---

# Una de cada cuatro personas tendrá un herpes zóster

27/05/2013

Una de cada cuatro personas desarrollará un herpes zóster a lo largo de su vida y, de ellas, entre el 15 por ciento y el 40 por ciento padecerá neuralgia postherpética, la complicación más frecuente, dolorosa e incapacitante de la enfermedad. Así lo han asegurado diversos expertos en enfermedades infecciosas y vacunología reunidos en el XVII Curso de Actualización en vacunas, celebrado en Barcelona, quienes han recordado que la edad es el principal factor de riesgo de esta enfermedad, cuya incidencia es elevada a partir de los 60 años.

# **Cambios en el calendario vacunal del Reino Unido**

27/05/2013

El Departamento de Salud de Inglaterra ha anunciado los próximos cambios que van a tener en el calendario de vacunación. Atañen a cuatro vacunas y en síntesis son: a) supresión de la dosis de vacuna antimeningocócica conjugada frente al serogrupo C de los cuatro meses en junio 2013 y su paso a los 12-13 años para la primavera de 2014, b) a partir de julio 2013 se introduce la vacuna monovalente frente a rotavirus, c) a partir del mes de septiembre 2013 se introduce rutinariamente la vacuna frente al herpes zóster a los 70 años con repesca hasta los 79 años, y d) en otoño 2013 se introduce la vacuna antigripal atenuada de los 2 hasta los 16 años de modo progresivo.

[\[Más información\]](#)

---

# **Fomento de la vacunación frente a sarampión en Reino Unido**

27/05/2013

Los médicos ingleses han sido emplazados por las autoridades

sanitarias para vacunar frente a sarampión, en un periodo de 5 meses, a aproximadamente un millón de niños no vacunados de 10 a 16 años. Los médicos percibirán 1.5 libras por cada niño identificado y vacunado. Además percibirán también 7.64 libras por cada mayor de 16 años que acuda a la consulta para recibir su dosis de vacuna triple vírica.

[\[Más información\]](#)