

Las vacunas de diseñador: seguridad, eficacia y rapidez

25/02/2015

Digan lo que digan los (irresponsables y hasta peligrosos) integrantes de los movimientos antivacunas, las vacunas han salvado más vidas que ningún otro invento, y son las principales responsables de que nuestra esperanza de vida haya pasado de unos 40 años a alrededor de 80. Como dice la periodista Laura Helmuth en la revista Slate: "Si antes teníamos derecho a una vida ahora tenemos derecho a dos". Pero con todo lo efectivas y seguras que son, las vacunas aún pueden ser mejoradas y, de hecho, lo están siendo con técnicas genéticas que permiten hacer vacunas sintéticas "bajo diseño" y con características especiales. Algunos de los avances más interesantes y prometedores, dirigidos sobre todo a control de enfermedades virales, se presentaron en la reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en San José, California.

[\[Más información\]](#)

El neumococo: Baleares sin vacuna hasta 2016

25/02/2015

Las presiones y recomendaciones de los pediatras de las Islas para que Baleares incluya «cuanto antes» la vacuna del neumococo en la Seguridad Social han caído en saco roto. La Conselleria de Salud no la financiará este año por motivos presupuestarios y esperará hasta el último momento para

incluirla en el calendario de vacunación, ya en 2016. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron en noviembre costear esta inmunización a partir de 2016, pero lo cierto es que la mayoría de comunidades autónomas ya han anunciado que adelantarán la vacuna este año.

[\[Más información\]](#)

Brote de sarampión en Estados Unidos

25/02/2015

Los 84 casos de sarampión procedentes de 14 Estados reportados en el mes de enero en los Estados Unidos exceden de los de los declarados a lo largo de todos los años precedentes, según el último informe de los CDC norteamericanos. Todos ellos están ligados a la asistencia al parque temático Disney de California en el mes de diciembre pasado y pueden hacer que el país se considere endémico otra vez. Una característica del brote es que se han afectado comparativamente más adultos que niños con una media de edad de los casos de 20 años. Han precisado hospitalización el 15% y la mayoría de los infectados no estaban vacunados. Anne Schuchat ha urgido a la población para que sus hijos reciban la vacuna triple vírica.

[\[Más información\]](#)

GSK y Novartis

25/02/2015

GlaxoSmithKline ha recibido la autorización para la transacción de vacunas con Novartis, una vez que ésta vendió su división al laboratorio inglés, aunque con ciertas condiciones que ambas partes han aceptado. Según ellas, GSK venderá sus vacunas frente a la meningitis, Nimenrix y Mencevax, y dos vacunas bivalentes de Novartis frente a difteria y tetanos que estaban disponibles en Alemania e Italia. Se estima que la transacción se habrá completado para el primer semestre de 2015.

[\[Más información\]](#)

Murcia inicia la vacunación frente al neumococo

25/02/2015

La Consejería de Sanidad de la Región de Murcia ha anunciado el inicio de la vacunación frente al neumococo en pauta de 2, 4 y 12 meses, y con carácter gratuito, para todos los niños nacidos a partir del primero de enero de 2015. La Consejería ha adquirido un total de 52.500 dosis por un importe de 2,2 millones de euros. La titular del Departamento recalcó los beneficios que esta medida reportará a la población murciana.

[\[Más información\]](#)

Disminuye la incidencia de cólera en Haití y República Dominicana

25/02/2015

Tanto Haití como la República Dominicana han reportado menor número de casos de cólera en 2014 respecto de 2013, según un informe de la PAHO de 31 de enero de este año. El primer país tuvo 27.753 casos con 296 fallecimientos lo que supone un descenso del 53% y del 50%, respectivamente. La República Dominicana, por su parte, reportó 597 casos con 10 muertes, lo que significa un descenso del 69.5% y del 76%, respectivamente.

[\[Más información\]](#)

Seguridad de la vacuna triple vírica en adultos

25/02/2015

Un estudio llevado a cabo por investigadores de los CDC norteamericanos y publicado on line en Clinical Infectious Diseases no ha encontrado ni nuevas ni inesperadas señales de alarma de seguridad respecto del uso de la vacuna triple vírica en adultos. La revisión, basada en datos recogidos del VAERS, incluyó 3.175 reportes de efectos adversos en adultos desde 2003 hasta 2013, de los que 168 se clasificaron como graves, incluyendo 7 fallecimientos. Los reportes más frecuentes fueron fiebre, exantema, dolor y artralgias. Los autores constataron, también, que al menos 131 embarazadas

habían sido vacunadas, la mayoría en el primer trimestre. El 38% reportó al menos un efecto adverso.

[\[Más información\]](#)

Libertad individual frente a interés colectivo

25/02/2015

Ha sido en el Estado de California, donde y como consecuencia de un brote de sarampión que comenzó el pasado mes de diciembre, y que ya afecta a más de un centenar de personas, tras destaparse el primer caso en el parque de atracciones de Disneylandia, cuando ha resurgido el ya “viejo” debate, extendido con esta ocasión a más de 14 estados de Norteamérica, sobre la obligatoriedad, de vacunar a los menores en edad preescolar, que en un 3,1 por ciento y en el periodo 2013-2014, en California, no tenían la vacuna del sarampión. Debate iniciado cuando sus legisladores han anunciado que introducirán una medida para revocar la ley que permite optar a los padres no vacunar a sus hijos sin que exista una razón médica, advirtiendo al tiempo sus autoridades que los estudiantes que ingresen al sistema de la Universidad de California en 2017, tendrán que estar vacunados contra el sarampión y otras enfermedades de acuerdo con las nuevas normas de inmunización anunciadas el pasado viernes 6 de febrero.

[\[Más información\]](#)

Pediatras recomiendan esperar media hora tras una vacuna para detectar reacciones alérgicas

25/02/2015

Los niños deben esperar media hora tras la vacuna para poder detectar posibles alergias o efectos adversos. Esta ha sido una de las recomendaciones que recoge un documento desarrollado por miembros de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap) y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), dirigido a los profesionales de Atención Primaria. Un escrito sobre cual es la actitud a tomar ante un niño con una reacción alérgica tras la vacunación o alergia a componentes vacunales. Se trata del primer texto existente para profesionales de Atención Primaria (AP). “Es fundamental hacer un diagnóstico correcto de las reacciones adversas atribuidas a las vacunas y confirmar si existe un origen alérgico, ya que podrían interrumpirse las siguientes inmunizaciones y el niño sería susceptible de tener aquellas enfermedades por las que ha dejado de vacunarse”, ha manifestado el coordinador del documento, Luis Echeverría, que pertenece a la unidad de Alergia y Neumología Infantil del hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés.

[\[Más información\]](#)

Sanidad incorpora al calendario la vacuna frente al neumococo e inicia una experiencia piloto con la del herpes zóster

25/02/2015

La Consejería de Sanidad ha incorporado al calendario de vacunaciones sistemáticas de la infancia de Castilla y León la vacuna conjugada 13V frente al neumococo y ha anunciado la puesta en marcha de una prueba piloto pionera en España de vacunación de herpes zóster en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) de entre 60 y 64 años. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública, Agustín Álvarez Nogal, y la jefa de Epidemiología de la Junta de Castilla y León, Sonia Tamames. El consejero ha anunciado estas dos medidas, junto a otras modificaciones en las vacunas como en la del Virus del Papiloma Humano (VPH), en la que se rebaja la edad de 14 a 12 años y se modifica la pauta de tres dosis a dos.

[\[Más información\]](#)