Vacuna de subunidades frente al herpes zóster

27/04/2015

La vacuna de subunidades frente al herpes zóster de GSK ha reducido de manera significativa el riesgo de padecimiento de la infección en mayores de 50 años, manteniendo la eficacia incluso en los de más de 70 años, según los resultados de un ensayo clínico fase III publicado en la edición on line de The New England Journal of Medicine. La población del estudio incluyó a 15.411 personas de 18 países, entre los que se encuentra España el Dr. Díez-Domingo, sin historia de zóster ni de vacunación frente a varicela, que recibieron dos dosis de vacuna separadas por dos meses. La eficacia fue del 97.2% y las tasas de incidencia no fueron diferentes entre los de 50 a 59 respecto de los de más de 60 años.

[\[Más información\]](#)

Vacuna tetravalente frente al VPH

27/04/2015

La vacuna tetravalente frente al VPH ha reducido significativamente la incidencia de displasia cervical y verrugas anogenitales en adolescentes canadienses, de acuerdo con un estudio publicado en Pediatrics. Los autores examinaron retrospectivamente las historias de dos cohortes de adolescentes de 14-15 años de Ontario, las de antes de la introducción de la vacuna y las de la misma edad tras la implantación del programa gratuito de vacunación y las

compararon con las que tenían al alcanzar los 16-18 años. Concluyen que sus resultados hablan favorablemente del valor de la vacunación en preadolescentes mediante un programa poblacional.

[\[Más información\]](#)

Enfermedad meningocócica por serogrupo B en la Universidad de Princeton

27/04/2015

Aunque no se ha dado casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B entre los estudiantes de la Universidad de Princeton que recibieron al menos una dosis de la vacuna Bexsero, el último caso en un contacto no vacunado apunta que los vacunados aún pueden ser capaces de transportar la bacteria en la nasofaringe. Durante la campaña recibieron al menos una dosis de la vacuna el 95% de los 5.800 estudiantes candidatos. El estudio se ha publicado en *Pediatrics* y sus autores concluyen que la investigación del brote y los buenos resultados de la campaña de vacunación pueden servir como modelo para abordar epidemias similares en un futuro.

[\[Más información\]](#)

Efectos secundarios asociados a las vacunas

27/04/2015

LEl Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza ha organizado un debate en el que se abordarán los problemas secundarios asociados a las vacunaciones tanto en humanos como en animales. 'Vacunas, aluminio y enfermedades autoinmunes ¿mito o realidad?' será el título de la conferencia que pronunciará Lluís Luján, profesor titular en Sanidad Animal del Departamento de Patología Animal Universidad de Zaragoza, para introducir el debate, que estará moderado por Jesús Santamaría, catedrático de Ingeniería Química Subdirector del INA (Instituto Universitario de Nanociencia).

[\[Más información\]](#)

Encuentros digitales y entrevistas

27/04/2015

La doctora M. J. Cilleruelo, pediatra del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, en el encuentro digital de 20 minutos respondió 22 preguntas. Con motivo de la Semana Mundial de la Vacunación la OMS denunció que uno de cada cinco niños de todo el mundo no tiene acceso a la vacunación. A las vacunas tradicionales como las que protegen frente a la difteria, tétanos, polio o sarampión se han unido nuevas inmunizaciones frente a la neumonía causada por neumococo o la diarrea por rotavirus y una corriente de

padres contrario a la vacunación. La doctora M. J. Cilleruelo, pediatra del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría respondió a los lectores sobre este asunto.

[\[Más información\]](#)

Las vacunas no son solo cosa de niños

27/04/2015

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”. Con esta frase del conocido escritor Mario Benedetti , el Dr. Amós García, presidente de la Sociedad Española de Vacunación (AEV), quiso poner de manifiesto la necesidad de concienciar a la población adulta de que “las vacunas no son solo cosa de niños” y que todos somos vulnerables ante las enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el motivo fundamental por el que los adultos prescinden de la vacunación es precisamente el éxito de los programas llevados a cabo, que han logrado reducir de forma tan clara la presencia de enfermedades que los ciudadanos han acabado por temer más a las vacunas que a las propias patologías.

[\[Más información\]](#)

Un millón y medio de niños mueren por enfermedades prevenibles con vacuna

27/04/2015

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) alertó de que la falta de vacunas pone en peligro a los niños y a sus comunidades, especialmente en zonas donde viven en condiciones de vulnerabilidad y/o exclusión. El acceso a la vacunación es una de las grandes campañas del organismo que desde la década de los 90 ha pasado de un 20 por ciento a un 84 por ciento de niños vacunados. En la actualidad, UNICEF tiene en marcha la campaña "100% niños vacunados", cuyo objetivo es que las vacunas lleguen a las comunidades más remotas del mundo y puedan ser administradas a todos los niños, estén donde estén. No obstante, según advierte UNICEF el avance se ha estancado en los últimos cinco años porque los servicios de vacunación no están llegando a los niños más vulnerables. En 2013, 21,8 millones de niños menores de un año (1 de cada 5 en el mundo) no recibieron las vacunas que pueden salvar sus vidas y protegerles de enfermedades y de la discapacidad.

[\[Más información\]](#)

Las enfermedades que nos traemos de las vacaciones

27/04/2015

No sólo hay que prevenir contra los virus sino evitar otros riesgos. Las enfermedades del viajero -infecciosas o de otra

índole- han existido siempre, son inherentes a la inquietud humana por explorar nuevos territorios. Sin embargo, los casos de contagio en el extranjero y la posibilidad de importar enfermedades a nuestro país -y que allí se expandan- crece como efecto colateral de la globalización. De hecho, cada año viajan 13 millones de españoles y un 9% de ellos (950.000 personas) lo hace a zonas tropicales.

Que una parte se contagie es solo cuestión de probabilidad y «las enfermedades no respetan fronteras», asegura el doctor José Antonio Delgado, responsable de la consulta de medicina del viajero y vacunación internacional de Clínica Vistahermosa. Al viajar, nos exponemos a una flora de microorganismos para la que muchas veces carecemos de protección y esto puede provocar una serie de infecciones, cuyo síntoma por excelencia es la diarrea. Algunas no son graves, aunque otras pueden ser más serias y se transmiten con facilidad, como el dengue o la malaria.

[\[Más información\]](#)

Nuevo estudio sobre triple vírica y autismo

27/04/2015

Un nuevo estudio publicado en la revista JAMA sobre 95.000 niños demostró que vacunar a los niños contra el sarampión, las paperas y la rubeola -la vacuna triple vírica- no aumenta el riesgo de autismo, a pesar de la suposición de algunos padres de que existe una correlación. A estas conclusiones han llegado tras analizar los datos de un amplio estudio de cohortes retrospectivo llevado a cabo en los Estados Unidos entre 2001 y 2012. Los autores recalcan que sus hallazgos no

indican una asociación deletérea entre esta vacuna y el autismo, incluso en aquellos con alto riesgo familiar.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Progresos hacia las metas vacunales para 2015

27/04/2015

En la Semana Mundial de la Vacunación la OMS ha comunicado que los progresos hacia las metas vacunales para 2015 aún están lejos de alcanzarse ya que 1 de cada 5 niños no recibe las vacunas rutinarias lo que podría evitar 1.5 millones de muertes anuales por inmunoprevenibles. En 2013, 22 millones de niños no recibieron tres dosis de DTP. La OMS propone tres medidas: 1) integrar la vacunación con otros servicios de salud como el cuidado postnatal de madres y bebés, 2) reforzar los sistemas sanitarios de manera que se administren las vacunas incluso en tiempos de crisis, y 3) asegurar que todos los países puedan acceder y pagar por las vacunas.

[\[Más información\]](#)