

# Mesalamina y vacunas inactivadas

14/02/2018

**Respuesta del Experto a ...**

Mesalamina y vacunas inactivadas

## **Pregunta**

Me gustaría saber si existe alguna contraindicación para administrar tanto la vacuna Ixiaro para la encefalitis japonesa, como Menveo para la meningitis ACYW, en un paciente de 31 años en tratamiento de Mezavant a dosis de 4,8 g/día.

Gracias

## **Respuesta de José Antonio Navarro (14 de Febrero de 2018)**

La mesalazina tiene cierto efecto inmunosupresor al alterar la función leucocitaria, al interferir con la síntesis de interleuquinas y deprimir la síntesis de células plasmáticas

(1) .

Al ser inactivadas ambas vacunas no habría problemas de seguridad aunque la respuesta inmune podría ser subóptima. Sería aconsejable , si es posible, interrumpir el tratamiento durante cuatro semanas y reiniciarlo dos semanas después de vacunar.

## **Referencias**

(1) Dieffenbach P et al. Mesalamine for Inflammatory Bowel Disease. Disponible en: [https://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-151-principles-of-pharmacology-spring-2005/assignments/0208\\_sulfa\\_slide.pdf](https://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-151-principles-of-pharmacology-spring-2005/assignments/0208_sulfa_slide.pdf)