

Primera dosis de vacuna, padecimiento de COVID-19 y vacunación posterior

14/03/2021

Respuesta del Experto a ...

Primera dosis de vacuna, padecimiento de COVID-19 y vacunación posterior

Pregunta

Buenos días.

Recibí una dosis de moderna y a la semana comencé con síntomas siendo la prueba de antígenos positiva. En principio me han dicho que no debería vacunarme con la segunda dosis o retrasarla a dentro de 6 meses. ¿Están de acuerdo con estas indicaciones? ¿Cuál sería la mejor actitud a seguir? Muchas gracias, un saludo

Respuesta de José Antonio Navarro (14 de Marzo de 2021)

Buenos días.

Según la actualización 4 de la estrategia de vacunación elaborada por el Grupo de Trabajo ad hoc del CISNS: "Personas de 55 o menos años de edad con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis. Se administrará una segunda dosis transcurridos seis meses desde el padecimiento o el diagnóstico de infección" ⁽¹⁾

Referencias

¹ Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 4. Disponible en: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromoc>

ion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_Estrateg
iaVacunacion.pdf