

# ESQUEMA DE VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN ADULTO CON IMPLANTE COCLEAR

12/09/2024

Respuesta del Experto a ...

NEUMOCOCO

## Pregunta

paciente en lista de espera para realización de implante coclear que acude a primaria derivado por ORL para vacunación antineumocócica indicando pauta secuencial neumovax 20+neumovax23. Ya ha sido administrada la dosis de neumovax20.

Quería confirmar que desde la comercialización de la vacuna conjugada neumovax20 no es necesaria la revacunación con neumovax23 aunque se trate de un grupo de alto riesgo. En caso de decidir administrarla, el tiempo mínimo de espera sigue siendo de 2 meses?

## Respuesta de José Antonio Navarro (11 de septiembre de 2024)

Buenos días.

Según el ACIP de los Estados Unidos (1), la pauta de vacunación sería:

Precisa de una dosis de PCV15 o PCV20. En el caso de esta última con esa dosis se finaliza el esquema de vacunación. Si se elige la opción de PCV15 debe recibir una dosis de PnPS23 para completar la pauta de vacunación. El intervalo sería de al menos un año, aunque en determinadas circunstancias (inmunodepresión, implante coclear o pérdidas de LCR) el intervalo puede acortarse a ocho semanas.

## Referencias

1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal

Vaccine Recommendations. Updated as of June 27, 2024