

ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE VACUNA MPOX Y FIEBRE AMARILLA

12/06/2026

Respuesta del Experto a ...

ÚLTIMAS CONSULTAS, de FIEBRE AMARILLA y de MPOX

Pregunta

Buenos días, ¿se puedo coadministrar vacuna de fiebre amarilla y vacuna de viruela del mono (mpox), o es necesario dejar algún intervalo entre vacuna y vacuna?. En ficha técnica de Imvanex pone lo siguiente: . 5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios de interacciones con otras vacunas ni otros medicamentos. Por lo tanto, debe evitarse la administración concomitante de IMVANEX con otras vacunas. No se ha estudiado y, por consiguiente, debe evitarse la administración concomitante de la vacuna con cualquier inmunoglobulina, incluida la inmunoglobulina contra la viruela vacunoide (IGV). Es por si disponéis de alguna información más.

Respuesta de José Antonio Navarro 11 de junio de 2026)

Buenos días.

El ACIP de los Estados Unidos (1) en su documento de 2023 dice:

“En relación a la coadministración con vacunas atenuadas (fiebre amarilla, sarampión y varicela) no se necesita intervalo entre Jynneos (Imvanex) y vacunas atenuadas ya que al contrario de otras atenuadas no se replica y a la hora de planificar la administración concomitante con otras vacunas Jynneos debe considerarse de una manera similar a la de vacunas no atenuadas”.

En base a la ficha técnica, deberá, por tanto, disponer de un consentimiento informado del paciente si se decide la administración concomitante.

Referencias

1. Rao A et al. Use of JYNNEOS (Smallpox and Mpox Vaccine, Live, Nonreplicating) for Persons Aged ≥ 18 Years at Risk for Mpox During an Mpox Outbreak: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices –United States, 2023. MMWR 2025;74:22