

# Antipalúdicos profilácticos y embarazo

28/08/2009

**Respuesta del Experto a ...**

Antipalúdicos profilácticos y embarazo

## Pregunta

Me caso el verano que viene y queremos irnos de viaje de novios a hacer un safari por África. Me han comentado que te tienes que vacunar contra la malaria y que durante 6 meses/ un año no te puedes quedar embarazada, es cierto? cuanto me tendré que esperar para poder quedarme embarazada sin riesgos? Gracias por todo.

**Respuesta de José Antonio Navarro (28 de Agosto de 2009)**

El periodo de evitación de embarazo dependerá de la quimioprofilaxis antipalúdica utilizada: Mefloquina: 3 meses; Doxiciclina: 1 semana; Atovacuona/proguanil: 2 semanas; Cloroquina: nada. Todos ellos tras la finalización del tratamiento(1)

## Referencias:

(1)Chiodini P, Hill D, Lalloo D, Lea G, Walker E, Whitty C and Bannister B. Guidelines for malaria prevention in travellers from the United Kingdom. London, Health Protection Agency, January 2007.

Disponible

en:

[http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb\\_C/1203496943523](http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1203496943523)