

Nuevo método de vacunación frente al SIDA

16/05/2011

Investigadores de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon en Beaverton (Estados Unidos) han conseguido el control eficaz de la infección en un modelo animal de VIH, concretamente en monos, utilizando un nuevo método de vacunación de administración viral a la célula. Los resultados del trabajo se publican en la revista 'Nature'. Según los investigadores, estas técnicas podrían proporcionar un nuevo método para el desarrollo de una vacuna para el VIH pero se necesitan ensayos en humanos para confirmar estos descubrimientos.

[\[Más información\]](#)

El Principado confirma que son seis los casos detectados de sarampión

16/05/2011

La directora general de Salud Pública, Amelia González, confirmó que los casos de sarampión detectados por el momento en Asturias son seis, pero no descarta que se produzcan más. Cuatro de ellos han sido diagnosticados en el área sanitaria VII, correspondiente a los concejos de Mieres y Aller, y otros dos en el área V, con cabecera en Gijón. La situación, según dijo Salud Pública tras conocerse los primeros casos, no debe generar alarma, ya que la vacuna protege contra el virus y la

tasa de vacunación alcanza en Asturias el 99 por ciento. El sarampión es una enfermedad viral aguda, altamente contagiosa, frente a la que se lleva vacunando a la población asturiana desde hace treinta años con vacunas eficaces y seguras. Estos casos de sarampión en Asturias son novedosos porque el último autóctono en el Principado databa de 1999 y el último brote de 1990.

[\[Más información\]](#)

Programa de vacunación en Ontario

16/05/2011

Ontario extenderá su programa de vacunación para combinar la vacuna triple vírica con la de varicela. Igualmente, el próximo agosto comenzará a abonar la vacuna frente a las infecciones por rotavirus y frente a la tos ferina para los adultos de 19 a 64 años.

[\[Más información\]](#)

El 80% de los viajeros españoles a países de riesgo

no se vacuna

16/05/2011

La nueva campaña del Ministerio de Sanidad, "La salud también viaja 2011", pretende concienciar a los viajeros españoles de la importancia de recibir asesoramiento médico antes de partir. "En cada país existen unas condiciones óptimas que se deben cumplir para que no suceda ninguna sorpresa negativa relacionada con la salud del viajero", ha asegurado Carmen Amela, directora general de Salud Pública y Sanidad exterior, mientras visitaba uno de los 84 centros de vacunación existentes en España.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

Nuevo aporte de 100 millones de dólares de GAVI en África

16/05/2011

La alianza GAVI ha comunicado que compromete un montante de 100 millones de dólares para eliminar de África la enfermedad meningocócica por serogrupo A, concentrando sus esfuerzos en los países hiperendémicos como Chad, Nigeria y Camerún. Estos se concretan en poner a disposición de los gobiernos la nueva vacuna MenAfriVac antes del inicio de la próxima temporada que comienza en diciembre. Igualmente se compromete a contribuir con 370 millones siempre que se financie por completo la estrategia regional por valor de 571 millones. El coste de la dosis de vacuna es de 0.67 dólares y en el primer país en el que se incluyó el pasado diciembre, Burkina Faso, se ha observado un descenso en el número de casos por vez primera. De manera que en la semana 14 se han declarado 2 casos

confirmados, ambos en no vacunados, frente a los 42 de la misma semana en la temporada anterior.

[\[Más información\]](#)

Reaparición del sarampión en Cataluña

16/05/2011

Los casos de sarampión en Cataluña se han incrementado, a pesar de que se puede prevenir con una vacuna, según ha alertado el Departamento de Salud en un comunicado en el que ha cifrado en 80 los enfermos contabilizados en el mes de marzo, la mayoría adultos sin vacunar. Desde Salud se ha señalado que una tercera parte de los casos de sarampión confirmados ha requerido hospitalización, y que todos ellos eran jóvenes, que es donde el riesgo de complicaciones es más elevado, y que todos han evolucionado bien. Ante esta situación, las autoridades sanitarias aconsejan a los ciudadanos mantener una buena cobertura de la vacuna y que, según el calendario vigente, se tomen las dosis correspondientes de la vacuna triple vírica (sarampión, parotiditis y rubéola) a los 12 meses y a los 4 años.

[\[Más información\]](#)

Estudios de inmunogenicidad y seguridad de la vacuna antineumocócica 13 valente

16/05/2011

El laboratorio Pfizer Inc. ha presentado los datos de sus dos estudios pivotaes fase III de inmunogenicidad y seguridad de la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos en adultos de 50 o más años. Los resultados se han presentado en el 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases en Milán. Los datos apuntan a que la vacuna es al menos tan inmunógena como la vacuna polisacárida simple para los 12 serotipos comunes a ambas y en las dos ramas del estudio: los naive a las dos vacunas y en aquellos que habían recibido con anterioridad la vacuna simple de 23 serotipos. La respuesta de anticuerpos funcionales fue significativamente mayor para la mayoría de los serotipos, incluido el 6A. En el Congreso se presentaron los estudios 004 y 3005 que a su vez comprenden seis estudios que incluyen 6.000 adultos de 50 o más años. El laboratorio ha remitido la pertinente información a las autoridades regulatorias de más de 40 países para la ampliación de las actuales indicaciones de Prevenar 13.

[\[Más información\]](#)

Caso de difteria en Francia

16/05/2011

Publicado en Euro Surveill (2011;16(19):pii=19867) y comentado en el apartado de bibliografía de este mes, el caso por el que el 14 de marzo de 2011 el French Institute for Public Health

fue informado por la Agencia Regional de Languedoc-Rousillon de un aislamiento de *Corynebacterium diphtheriae* en un paciente con amigdalitis y pseudomembranas. El sujeto carecía de historia de vacunación y de viajes recientes a zonas endémicas. La evolución con tratamiento antibiótico fue buena, negativizándose el cultivo a los seis días de comenzado el mismo. Se identificaron 53 contactos próximos a los que se les recogió frotis nasofaríngeo y profilaxis antibiótica. Todos ellos fueron negativos, excepto la pareja del caso índice que era portadora asintomática y había sido vacunada con DTP en 2006 por lo que recibió una dosis de recuerdo y azitromicina durante 3 días. Al haber asistido al Carnaval de Sitges días antes del proceso, es posible que la transmisión hubiera tenido lugar en ese evento. Estos casos suponen la primera notificación de *C. diphtheriae* en Francia desde 1989.

[\[Más información\]](#)

Los expertos alertan de un creciente rechazo a las vacunas infantiles

16/05/2011

Los padres cometen una «gran equivocación» al no vacunar a sus hijos. Lo dice el director general de Salud Pública de Valencia, Manuel Escolano, ante el «ligero, pero preocupante» incremento del número de progenitores que se niegan a inocular a sus vástagos las vacunas que habrán de protegerles contra enfermedades como el sarampión, la varicela, el tétanos, la meningitis C o la hepatitis A. Es más, a medida que aumenta la edad de los niños, se aprecia una disminución de la cobertura

de vacunación y esta tendencia, en autonomías como la andaluza está provocando un «problema tremendo» con el repunte del sarampión, que parece haberse extendido también a Canarias. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y «multitud de colectivos e instituciones de renombre» corroboran la eficacia de las vacunas y aconsejan su inyección más aun si la alternativa, como ocurre en los casos más graves, es que el niño fallezca.

[Más información]

Cataluña hará constar por escrito si un padre rechaza las vacunas

16/05/2011

Los padres que decidan no vacunar a sus hijos en Cataluña deberán firmar un documento en el que conste que han sido informados de los riesgos que esa decisión puede comportar para la salud de su prole. La Generalitat ha tomado esta decisión alarmada por el repunte de enfermedades como la tos ferina y el sarampión. Según el Departamento de Salud, se trata de un documento informativo para los profesionales, y no de un registro. Los profesionales recordarán a los padres los problemas que puede ocasionar su decisión, no solo para sus hijos, sino para el conjunto de la comunidad en la que viven. El sarampión repunta en España -más de 600 casos este año- y los expertos denuncian que los padres partidarios de la no vacunación tienen buena parte de culpa.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)