

DTP y calendario retrasado

29/08/2006

Respuesta del Experto a ...

DTP y calendario retrasado

Pregunta

Se trata de una niña española nacida en noviembre de 1999 y que ha recibido las siguientes vacunas:

1ª dosis de DTP y Polio en febrero de 2000.

2ª dosis de DTP y Polio en noviembre de 2000.

3ª dosis de DTP y Polio en mayo de 2003.

Se considera correcta esta pauta de admon de estas dosis y en caso correcto cuando se debería administrar la 4ª dosis y cual sería el intervalo mínimo con la dosis anterior.

Milagros Perucha González

Consejería de Salud de La Rioja

Respuesta del Dr. José Antonio Navarro (22 de mayo de 2003)

La pauta que nos comenta no es la más adecuada ya que para los tres años y medio lleva 3 dosis de polio y 3 de DTP a intervalos incorrectos. La pauta correctora en este caso sería administrar la cuarta dosis de polio oral y la cuarta de difteria, tétanos, pertussis (DTPa) pasados 6 meses desde la tercera(tendrá más de cuatro años en ese momento). Como la cuarta dosis se administrará por encima de los 4 años, no es necesario administrar ninguna otra dosis ni de polio ni de difteria, tétanos y tos ferina (1).

(1) Centers for Disease Control and Prevention. Recommended Childhood and Adolescent Immunization Schedule. United States, 2003. MMWR 2003;52:Q1-4