Impacto de la vacunación con 4CMenB (Bexsero)

23/01/2020

Un estudio publicado en la revista *New England Journal of Medicine* por parte de miembros de *Public Health England* respecto del seguimiento a tres años de programa de **vacunación con 4CMenB (Bexsero)** en esquema de tres dosis a los 2, 4 y 12 meses, ha mostrado que la vacuna ha tenido un importante impacto en las tasas de incidencia de EMI-B en menores de cinco años con un descenso estimado del 75%, lo que se traduce en una estimación de 277 casos evitados.

Por otra parte, la efectividad de dos dosis en menores de 13 meses fue del 52.7% y del 59.1% la de la pauta 2+1 en menores de tres años y de los 144 casos de EMI-B en edades elegibles para vacunar, se registraron 62 casos en niños que habían recibido al menos dos dosis de vacuna.

Además, un estudio en más de 21.000 adolescentes australianos no ha mostrado efecto de la vacuna 4CMenB en el transporte nasofaríngeo de los vacunados.

- Vacunación de lactantes con la vacuna meningocócica del grupo B (4CMenB) en Inglaterra
- Vacuna contra el meningococo B y transporte meningocócico en adolescentes en Australia
- Buenas y malas noticias – Vacuna 4CMenB para el Grupo B *Neisseria meningitidis*