

# Intervalo entre dosis de vacuna de varicela

07/07/2009

**Respuesta del Experto a ...**

Intervalo entre dosis de vacuna de varicela

## **Pregunta**

Estimados señores: Me gustaría hacerles un par de preguntas sobre la vacuna para la varicela. Si un niño nacido el 11/2006 se vacuna de varicela ahora. ¿Hay que administrar una segunda dosis?. ¿Qué intervalo habría que dejar entre ambas?. Dependiendo del intervalo, si se tuviera que vacunar también de gripe en octubre, ¿qué intervalo hay que dejar entre vacuna de la gripe y de varicela?. Y por último, ¿hay algún problema para vacunarlo si la madre está embarazada pero esta ha pasado la varicela en edad escolar?. Les agradezco sus respuesta por adelantado. Un saludo

## **Respuesta de José María Bayas (7 de Julio de 2009)**

Actualmente las recomendaciones de vacunación de varicela a cualquier edad incluyen dos dosis de vacuna. El intervalo de tiempo más adecuado para un niño menor de 13 años es de tres meses. Si recibiera ahora (mes de julio) la primera dosis, la segunda corresponderías en octubre. La segunda dosis de varicela (es vacuna atenuada) puede recibirla el mismo día que la vacuna antigripal (es vacuna inactivada), obviamente en diferente área anatómica. Esta opción es operativa, pero también podrían administrarse con cualquier intervalo de tiempo. El niño puede recibir la vacuna de la varicela independientemente de que la madre esté o no esté embarazada. La madre ya tuvo la varicela en la edad escolar. Si fuera susceptible (comprobado mediante examen serológico), la vacunación de su hijo de 5 años podría tener especial interés

ya que el niño sería una potencial fuente de infección para la madre, mientras que la posibilidad de transmisión de los virus vacunales es extremadamente remota. A propósito de vacunas, de gripe y de embarazos, aprovechamos para recordar que las embarazadas deben vacunarse de la gripe (también en el primer trimestre).

### **Referencias**

Centers for Disease Control and Prevention. General Recommendations on Immunization Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2006; 55 (No. RR-15): 1-48 (<http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5515.pdf>)