

Intervalo entre dosis de vacuna frente al virus del papiloma humano

24/04/2009

Respuesta del Experto a ...

Intervalo entre dosis de vacuna frente al virus del papiloma humano

Pregunta

Tengo dudas sobre el intervalo máximo entre la 1 y 2 dosis de vph cervarix, y entre 2 y 3. Hay niñas que han iniciado la vacunación y la han abandonado debido a las noticias de lo ocurrido con vph gardasil en otra comunidad. ¿Cuando deciden continuarla que intervalos tenemos que considerar entre dosis? Gracias

Respuesta de Jaime Jesús Pérez (24 de abril de 2009)

Las Recomendaciones Generales sobre Vacunación del ACIP (1) dicen que los intervalos mayores de los recomendados entre dosis de vacuna no reducen el título final de anticuerpos aunque la protección no se conseguiría hasta administrar la pauta completa. Esto implicaría que no habría que reiniciar pauta, sólo continuar con la vacunación. Según ficha técnica (2) la pauta de Cervarix es 0,1 y 6 meses por lo que si han interrumpido la pauta tras la primera dosis, habría que continuarla con una segunda dosis en el momento de reiniciar pauta (siempre que haya transcurrido un periodo mínimo de 1 mes) y administrar la tercera dosis 5 meses después de la segunda. En caso de haber interrumpido la pauta con 2 dosis administradas, tendrá que completar la pauta con la tercera dosis en cualquier momento siempre que hayan transcurrido al menos 5 meses desde la segunda.

Referencias

(1)Centers for Disease Control and Prevention. [General Recommendations on Immunization]. MMWR 2006;55 (No. RR-15):[2-9]. Disponible en:

<http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5515.pdf>

(2)EMA. Ficha Técnica de Cervarix. 2007. Disponible en: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cervarix/H-721-P-I-es.pdf>