

Intervalo entre vacunas vivas

02/12/2010

Respuesta del Experto a ...

Intervalo entre vacunas vivas

Pregunta

Buenos días. Aunque en la ficha técnica de Varivax no pone que no pueda ser administrada junto a Triple Vírica, creo haber leído en alguna publicación USA (pero no la encuentro) reciente que no deben de ser administradas conjuntamente sino con un 1 mes de diferencia. ¿Qué me podrían decir?. Muchas gracias. Un saludo.

Respuesta de José Antonio Navarro (2 de diciembre de 2010)

El Red Book de la American Academy of Pediatrics (1) claramente especifica lo siguiente: "si las vacunas vivas no se administran simultáneamente, debe de dejarse un margen entre ellas de al menos 4 semanas".

Es por ello que lo más conveniente es administrarlas en el mismo acto vacunal.

Referencias:

American Academy of Pediatrics. Simultaneous Administration of Multiple Vaccines. In: Pickering LK, ed. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2009:33-34. Available at: <http://aapredbook.aappublications.org/cgi/content/full/2009/1/1.5.9>. Accedido Diciembre 2, 2010.