

Intervalo mínimo entre segunda y tercera dosis de vacuna

11/08/2009

Respuesta del Experto a ...

Intervalo mínimo entre segunda y tercera dosis de vacuna

Pregunta

Corrección de cambios en calendario de vacuna VPH. Se trata de una chica que comienza su pauta vacunal en momentos 0, 1 mes y en lugar de última dosis a los 6 meses, se le coloca la tercera dosis a los 2 meses de la primera (0,1,2). En este caso que estaría recomendado: ¿dejar tal cual? ¿poner nueva dosis transcurridos 5-6 meses desde la primera dosis?. Gracias y un saludo

Respuesta de José Antonio Navarro (11 de Agosto de 2009)

Aunque la pauta correcta de Cervarix es, según ficha técnica, la de 0, 1 y 6 meses, el Departamento de Salud del Reino Unido, en el Green Book (1), textualmente dice: "No se dispone de datos clínicos acerca de si el intervalo entre la dosis 2ª y 3ª puede reducirse por debajo de los 3 meses. Cuando la segunda dosis se administra tardíamente y existe una alta posibilidad de que la vacunada no vuelva para una tercera dosis a los 3 meses de la segunda, o si por razones prácticas no es posible programar la tercera dosis con ese intervalo, entonces se puede administrar una tercera dosis de Cervarix al menos un mes tras la segunda". Por tanto, ante la ausencia de datos clínicos y teniendo en cuenta que lo anteriormente comentado se refiere a cuando la segunda dosis se administra tardíamente, se podría, en el momento actual, y en base a opiniones de expertos, considerarla como bien vacunada aunque

es probable que los títulos de anticuerpos no sean óptimos.

Referencias:

(1) Department of Health. Immunisation against infectious diseases. the Green Book. Disponible en: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_087786.pdf