

# Intervalos de vacunación con la vacuna frente al virus del papiloma humano

24/07/2009

**Respuesta del Experto a ...**

Interrupción de la pauta de vacunación frente a la hepatitis B

## **Pregunta**

Buenas tardes. Tengo una hija de 15 años a la que, según me recomendó el especialista puse la vacuna del virus del papiloma GARDASIL , la segunda a los seis meses como me dijeron, y la tercera he ido a los seis meses de la segunda, pero en el centro de salud las enfermeras me han comentado que tendría que habérsela puesto a los tres meses, no se si ahora habrá que poner alguna dosis más, o la vacuna habrá sido eficaz, o no le ha servido para nada. Muchas gracias por su atención.

## **Respuesta de Fernando Moraga (24 de Julio de 2009)**

El esquema de vacunación con Gardasil consiste en tres dosis de 0,5 ml de acuerdo con la siguiente pauta: 0, 2 meses después de la primera dosis, y 6 meses tras la primera dosis. Sin embargo, existen esquemas alternativos en los que hay que tener en cuenta los siguientes intervalos mínimos: la segunda dosis debe administrarse al menos un mes después de la primera dosis y la tercera dosis, al menos tres meses después de la segunda. En el caso de la pregunta, si bien no se ha seguido el esquema recomendable (se ha hecho una pauta 0, 6 y 12 meses) se han observado los intervalos mínimos comentados, por lo que la adolescente debe considerarse bien vacunada. Además las tres dosis se han administrado dentro de un periodo de un año como se recomienda en la ficha técnica. Como en casi todas

las vacunas no hay intervalos máximos entre las dosis y por tanto no hay que reiniciar pautas sino completarlas.