

Linfadenopatías regionales tras inmunización con vacunas ARNm

18/01/2021

Respuesta del Experto a ...

Linfadenopatías regionales tras inmunización con vacunas ARNm

Pregunta

Me han puesto la vacuna de Pfizer de COVID y tengo 3 adenopatías axilares izquierdas bastante grande. En la consulta de Ginecología he mandado bastantes vacunas de Gardasil y recuerdo una paciente que la primera dosis tuvo linfadenitis, y en la segunda dosis tuvo una linfadenitis masiva que impidió poner la tercera dosis. Mi pregunta es si sería recomendable no ponerme la segunda dosis de Pfizer como consecuencia de esta reacción que he tenido.

Respuesta de José Antonio Navarro (18 de Enero de 2021)

Buen día.

Se ha descrito en los ensayos clínicos de las vacunas de mRNA (más frecuentes con las de Moderna) la linfadenopatía en los lugares de drenaje correspondientes al punto de inoculación (habitualmente axilar). En ellos, la duración promedio tras la primera dosis fue de 24 horas y de 48 horas tras la segunda. Debido al riesgo de exposición al SARS-CoV-2 es aconsejable la recepción de la segunda dosis para disponer de una óptima protección. Analgésicos y frío local es lo aconsejable.