

# **Los CDC de los Estados Unidos publican sus recomendaciones de vacunación antigripal para la temporada 2020-2021**

25/08/2020

Como en todas las temporadas gripales precedentes, los CDC de los Estados Unidos publican las [recomendaciones](#) del ACIP en relación a la campaña de vacunación antigripal, en este caso para la de 2020-2021. Como novedades más resaltables destacan:

- Se ha actualizado la composición de los antígenos vacunales.
- Se incluyen dos nuevas vacunas, la tetravalente de alta carga antigenica (60 microgramos de hemaglutinina) para los de 65 o más años, cuyo volumen de inoculación es de 0.7 cc. y la tetravalente adyuvada con MF59.
- Se han actualizado las contraindicaciones de las vacunas intranasales atenuadas.
- Deben recibir la vacuna durante la temporada gripe aquellos no vacunados que padecen la gripe, ya que la vacuna les puede proteger frente a otras cepas gripales.
- Se contempla el intervalo entre la recepción de vacunas atenuadas y los nuevos antivíricos (baloxavir), de manera que no se puede recibir esa vacuna en los 17 días posteriores a la administración de baloxavir.
- En cuanto a la vacunación de personas alérgicas al huevo, recomiendan que la vacunación supervisada por sanitarios con experiencia en el manejo de estas reacciones en aquellos con historia de reacción alérgica grave, sea implantada para todas las vacunas excepto para los que reciban las de cultivo celular o recombinante.

