

Miopatía un efecto secundario a la aplicación de determinadas vacunas

31/08/2006

Respuesta del Experto a ...

Miopatía un efecto secundario a la aplicación de determinadas vacunas

Pregunta

Estimados compañeros:

Tengo un paciente en mi consulta que está diagnosticado tras biopsia de músculo, de miopatía por hipotrofia de fibras tipo I. La historia clínica de su "astenia a estudio", se inició desde que en servicio de alergología, se le da un tratamiento con vacunas por rinitis alérgica, la composición de dicha vacuna es, según leo en la fórmula: *derm.pter* y *derm.farinae*. ¿Opináis que pueda ser esta miopatía un efecto secundario a la aplicación de sus vacunas?

Respuesta de Dr. Fernando Moraga (12 de noviembre de 2002).

El diagnóstico que se señala en la pregunta miopatía por hipotrofia de fibras tipo I indica un hallazgo inespecífico que se encuentra asociado a varias miopatías, aunque la mayoría de ellas de tipo congénito.

La hiposensibilización específica mediante vacunas que contienen extracto de alérgenos de *Dermatophagoides pteronyssinus* y *farinae* no se ha demostrado que tenga una relación de causalidad con miopatías.

Sería interesante disponer de información de si la vacuna que

se comenta contiene además, como adyuvante, hidróxido de aluminio, ya que se han descrito algunos casos de afectación muscular o miopatía en el deltoides, en el que se inyectó la vacuna. Por tanto, habría que conocer también si la biopsia muscular se realizó en el músculo donde se habían inyectado antes las vacunas".