

# NÓDULOS SUBCUTÁNEOS PRURIGINOSOS POSTVACUNALES E INMUNIZACIONES FUTURAS

10/06/2024

**Respuesta del Experto a ...**

ÚLTIMAS CONSULTAS y de SEGURIDAD VACUNAL

## **Pregunta**

La situación es; niña ahora de 24 meses que presenta nódulo subcutáneo con picor permanente en todas las zonas de punción de las vacunas sistemáticas, vasto externo del muslo y también en deltoides de las de 12 y 15 meses. Se le comentó a los padres que éste nódulo tendría tendencia a irse pero ahora con más de 24 meses persiste y incomoda el picor.

Sospechamos de una reacción adversa por el aluminio o algún adyuvante de las vacunas, ya que no ha sido una en concreto.

De cara a la próxima (3años) vacuna tetravírica (TV+ VVZ), que le tocaría, en nuestro centro actualmente Proquad. Qué recomendaciones debería seguir? Hay alguna marca menos reactógena que otra? mejor Tv y VVZ por separado como a los menores de 3 años? Qué consejo debo seguir? Gracias

## **Respuesta de José Antonio Navarro (7 de junio de 2024)**

Buenas tardes.

Parece tratarse de nódulos subcutáneos pruriginosos causados por hipersensibilidad retardada tipo IV de Coombs al aluminio que no contraindica vacunaciones futuras. La resolución es lenta pero en ningún caso se esperan reacciones sistémicas. Por supuesto debe recibir la vacuna tetravírica y mejor por vía intramuscular (1,2).

## Referencias

1. Bergfors E et al. Br Med J Case Reports 2013:bcr2012007779
2. Silcock R et al. Hum Vaccines Immunotherapeutics 2019;17:5: 1329-1341