

# Orden de administración de vacunas en relación al dolor vacunal

23/03/2016

**Respuesta del Experto a ...**

Orden de administración de vacunas en relación al dolor vacunal

## Pregunta

¿Existen algún orden a la hora de poner primero una u otra vacuna al administrar las correspondientes al calendario vacunal en los niños? ¿Cuáles son más ó menos dolorosas?

**Respuesta de José Antonio Navarro (22 de Marzo de 2016)**

Muchas gracias por su “amable” pregunta.

Al ser el dolor un síntoma subjetivo, no hay una escala reconocida que gradúe el que provoca cada vacuna individualmente. Tradicionalmente se asume que las vacunas más dolorosas son triple vírica, papilomavirus humano y antineumocócica conjugada de 13 serotipos <sup>(1,2)</sup>, que serían las que se administrarían en último lugar en situaciones de administración múltiple en una misma visita.

## Referencias

<sup>(1)</sup>. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook – 13th Edition (2015)

<sup>(2)</sup>. Taddio A et al. Reducing the pain of childhood vaccination: an evidence-based clinical practice guideline. CMAJ 2010;182(18):1989-95