

EEUU: Comité aprueba nueva vacuna para meningitis

30/06/2015

Un comité federal dio un débil espaldarazo a dos vacunas costosas contra la meningitis, en el que se negó a recomendar que todos los adolescentes reciban la vacuna y dejó la decisión a padres y médicos. En una reunión en Atlanta, el comité aprobó una medida intermedia que dice que adolescentes mayores y adultos jóvenes pueden recibir las vacunas, si ellos y sus padres quieren dar el paso. La declaración basta para darle luz verde a la cobertura del seguro para las nuevas vacunas.

También podrá motivar a algunas universidades a exigir que sus alumnos de nuevo ingreso se vacunen, dijeron algunos expertos. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización votó 14-1 en favor de la aprobación parcial. Los motivos aducidos han sido las incertidumbres existentes alrededor de su seguridad ("banderas rojas"), la efectividad y la protección a largo plazo. Un miembro del Comité comentó que la recomendación podría pasar a categoría "A" (uso rutinario para todos los sujetos de una edad/es determinada/s) cuando se disponga de datos adicionales sobre la seguridad. El Comité no se ha decantado por ninguna de las dos vacunas, Bexsero o Trumemba. La primera consta de dos dosis a un precio de 160 dólares/dosis y la segunda en tres dosis a 115 dólares/dosis.

[\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#)

ACIP modifica sus recomendaciones sobre la vacuna antineumocócica

30/06/2015

El Advisory Committee on Immunization Practices ha modificado sus recomendaciones previas relativas al intervalo entre la recepción de la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos y la polisacárida de 23 en personas mayores de modo que siempre debe de transcurrir un año entre ambas. Hasta ahora las recomendaciones estipulaban un margen de 6 a 12 meses. Para aquellos que recibieron la de 23 serotipos en primer lugar, el intervalo sigue siendo de 12 meses.

[\[+ información\]](#)

La Asamblea de California aprueba las vacunas obligatorias y más estrictas

30/06/2015

Los legisladores de California aprobaron una de las inmunizaciones más estrictas y obligatorias para la gente en todo el país. Esta medida eliminará la opción de los padres para evitar que sus hijos no reciban las vacunas por motivos personales o religiosos. La medida, SB277, una de las más controversiales en el estado este año, requerirá que todos los niños que entran al kínder en cualquier institución, pública o privada, en California, debe de haber recibido todas las

vacunas obligadas, incluyendo la de sarampión y tosferina, a menos que un doctor apruebe una exención sobre las condiciones médicas muy específicas como alergias y deficiencias del sistema inmunológico. La medida SB277 que fue aprobada por el Senado anteriormente, se espera que apruebe algunas modificaciones realizadas en la Asamblea para después mandarla al escritorio del gobernador, quien tiene hasta el 11 de septiembre para firmarla y convertirla en ley. La nueva ley hace de ese Estado uno de los más estrictos respecto a las exenciones vacunales, al igual que Mississippi y West Virginia.

[\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#) [\[+ información\]](#)

Sepsis y alteración de la respuesta inmune

30/06/2015

Investigadores de la Universidad de Duke han comparado la incidencia de evaluaciones de sepsis, de soporte respiratorio, intubación, convulsiones y fallecimientos en más de 13900 neonatos de muy bajo peso al nacer durante los tres días antes y después de la vacunación. La incidencia de analíticas para diagnosticar sepsis aumentó del 5.4/1000 pacientes prevacunación a 19.3 tras la misma. La necesidad de apoyo respiratorio de 6.6 a 14 y la de intubación de 2 a 3.6/1000. Los efectos adversos fueron similar independientemente del tipo de vacuna recibida, incluidas las vacunas combinadas. Los autores del estudio piensan que hace falta disponer de más estudios para determinar si el orden y el momento de la vacunación influyen en la incidencia de efectos adversos postvacunales y si una historia previa de sepsis confiere un

mayor riesgo de alteración de la respuesta inmune. Los resultados han sido publicados en JAMA Pediatrics.

[\[+ información\]](#)

Una treintena de recién nacidos cada año no recibe las vacunas del calendario en Murcia

30/06/2015

Sanidad cifra en un 99,8% la tasa de cobertura y asegura que el rechazo a proteger a los hijos *“es residual y basado en una filosofía no científica”* – Lorenzo, sobre el caso del niño con difteria en Cataluña: *“Lo ocurrido demuestra que no vacunar puede tener consecuencias graves en este mundo globalizado”* En la Región de Murcia en torno a una treintena de recién nacidos no reciben las vacunas del calendario vacunal, según una estimación partiendo de los datos que maneja Sanidad. José Antonio Navarro, jefe de Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la dirección general de Salud Pública y Drogodependencias, asegura que la tasa de vacunación en la Región es del 99%. Del 1% restante, Sanidad asume que ocho de cada diez recibe las protecciones, pero que por errores del sistema no se registran. Eso deja una estimación de un 0,2% de bebés que no reciben vacunas. Navarro sostiene que entre los padres que deciden no poner vacunas a sus hijos «están los que tienen dudas por los posibles efectos de los que muchos hablan y lo que no tienen miedo a la enfermedad», aunque insistió, *«en que este movimiento es más una filosofía de vida que no*

está sustentada en evidencias científicas».

[\[+ información\]](#)

Bexsero en Reino Unido

30/06/2015

El Departamento de Salud de Inglaterra ha hecho público el documento relativo a la introducción de la vacuna antimeningocócica recombinante Bexsero en el calendario sistemático de vacunación. En concreto, comenzarán con los nacidos desde el 1 de julio que recibirán la vacuna a los 2, 4 y 12 meses. Los nacidos entre el 1 de mayo y el 30 de junio recibirán 1 ó 2 dosis en el primer año más un recuerdo a los 12 meses. Destaca la recomendación de administrar paracetamol profiláctico a dosis de 2,5 cc (120 mgs/5 cc) con las dos primeras dosis (al momento de vacunar y dos dosis más a las 4-6 horas).

[\[+ información\]](#)

Vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente en Inglaterra

30/06/2015

El Departamento de Salud de Inglaterra ha hecho público el documento relativo a la introducción de la vacuna

antimeningocócica conjugada tetravalente en el calendario sistemático de vacunación. La vacunas Nimenrix o Menveo se administrarán a los 17 años y a los nuevos universitarios mediante una campaña urgente de repesca a realizar a la mayor brevedad, a los de 14 años mediante una repesca a partir de enero de 2016, y mediante la sustitución de la actual vacuna MenCC por la tetravalente a los de 13 y 12 años en otoño de 2015.

[\[+ información\]](#)

Disminuye la tasa de lesiones cervicales de alto grado en los Estados Unidos

30/06/2015

Un estudio publicado en la edición on line de la revista Cancer liderado por la Dra Susan Hariri de los CDC norteamericanos ha encontrado que las tasas de lesiones cervicales de alto grado en los Estados Unidos han caído dramáticamente entre 2008 y 2012, lo que pudiera estar causado tanto por la vacunación frente a VPH como a los cambios en las pautas de cribado puestas en marcha en 2012. Los investigadores analizaron las tasas en mujeres de 18 a 39 años procedentes de California, Nueva York, Oregon y Connecticut y comprobaron como las tasas experimentaron significativas reducciones en las de 18 a 20 años, con descensos del 94/100.000 o del 202/100.000 a 5/100.000 o 37/100.000, en California y Oregon, respectivamente. Cayeron en menor cuantía en las de 21 a 29 y no descendieron en las de 30 a 39.

[\[+ información\]](#)

GSK vende dos de sus vacunas frente a meningitis a Pfizer

30/06/2015

Al objeto de evitar monopolios el laboratorio GlaxoSmithKline ha vendido dos de sus vacunas frente a meningitis a Pfizer, por un total de 130 millones de dólares. Ambas vacunas, Nimenrix y Mencevax, no están disponibles en el mercado norteamericano y están dirigidas frente a cuatro serogrupos meningocócicos (ACWY). Las ventas de las dos supusieron durante el pasado año un total de 34 millones de libras esterlinas. Con esta adquisición Pfizer se consolida como referencia en la prevención de la enfermedad meningocócica al comercializar Trumemba y Neis-VacC.

[\[+ información\]](#)

El vídeo de la semana: ¿deben ser obligatorias las vacunas?

30/06/2015

Publicado por EL HUFFINGTON POST. Ha fallecido el niño de Olot contagiado por difteria, una enfermedad que no se veía en España desde 1987. Sus padres no lo habían vacunado, aunque después del contagio se la pusieron a todos sus hijos. Los antivacunas son grupos de poca presencia en España, aunque la ley es muy permisiva: el calendario de vacunación es una recomendación de las autoridades sanitarias, pero los padres

no están obligados a seguirlo. ¿Debe ser obligatorio vacunar a los niños? ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad de los que se niegan a cumplirlo y ello derive en consecuencias trágicas? Hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué opinan de un tema que hasta la fecha suscitaba poco debate en este país.

[\[+ información\]](#)