

Brote de sarampión en un crucero

27/03/2014

Ascienden a 34 los casos de sarampión asociados a un crucero marítimo por el Mar Mediterráneo, de los que 33 son italianos y 1 austriaco, 22 son miembros de la tripulación u otros trabajadores y 7 en pasajeros. El genotipo aislado en 11 casos es el B3. Como respuesta al brote se han vacunado más de 800 miembros de la compañía marítima entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

[\[Más información\]](#)

Embarazo y riesgo de infección por papilomavirus

27/03/2014

Según un estudio publicado en la edición on line de Epidemiology and Infection, el embarazo hace más susceptibles a las mujeres a la infección por el virus del papiloma humano, especialmente si son menores de 25 años. Los autores llevaron a cabo una revisión sistemática hasta abril de 2013 y seleccionaron 28 estudios con 13.640 mujeres. La prevalencia global en embarazadas fue del 16.82% y de 12.25% en las que no lo estaban ($p < 0.001$). En embarazadas de menos de 25 años llegó al 23.95%, al 13.34% en las de 25 a 29 y al 14.79% en las de 30 o más años. La Odds ratio para VPH en embarazo fue de 1.42 y de 1.79 en las de menos de 25 años.

[\[Más información\]](#)

Riesgo de transmisión gripal en el centro de salud

27/03/2014

Los niños y familiares que acuden a las “revisiones del niño sano” para recibir vacunas durante la temporada gripal pueden estar en riesgo de contraer enfermedades tipo gripal desde otros niños que visitan la misma consulta. Los miembros de la familia tenían mayores probabilidades de haber asistido a una consulta en las dos semanas previas. A la vista de estos datos los investigadores recomiendan que los ambulatorios refuercen las medidas de control de la infección, del tipo de la higiene de manos y de las restricciones de uso de juguetes comunes. El estudio utilizó datos de una encuesta de 1996 a 2008 que incluyó a más de 84.000 familias. Estiman que el riesgo pudiera suponer un coste de 500 millones de dólares anualmente.

[\[Más información\]](#)

Asesinada una trabajadora de un equipo de vacunación contra la poliomelitis en

Peshawar

27/03/2014

Las autoridades paquistaníes han informado del descubrimiento del cadáver de una trabajadora de un equipo de vacunación contra la poliomielitis secuestrada en la localidad paquistaní de Peshawar. La fallecida ha sido identificada como, Salma Faruqui, de 30 años de edad, una de las principales referencias de la campaña contra la polio lanzada recientemente por el Gobierno de Jiber, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'. Los talibán afganos cambiaron su política al respecto, permitiendo las vacunaciones en los últimos años, ha habido una disminución de los casos en el país, pasando de 80 casos en 2011 al 14 en 2013. Algunos grupos vinculados a los talibán paquistaníes también se han pronunciado a favor de las vacunaciones en los últimos meses, si bien algunos siguen bloqueando los esfuerzos en este sentido y atacan a los equipos médicos y a las fuerzas de seguridad que les protegen.

[Más información]

Cinturón Bíblico holandés: el grupo religioso que se opone a las vacunas

27/03/2014

Conocidos así por la zona en que se emplazan -desde el suroeste de Holanda hasta IJsselmeer al noroeste del país-, más de medio millón de cristianos viven al pie de la letra las doctrinas de la Biblia dejadas por el reformista Juan Calvino.

La ciudad de Staphorst es considerada la capital de la religión cristiano ortodoxa de Holanda. Allí viven los adeptos a la teología protestante, lugar donde no se permite la blasfemia -aunque sin pena- y las mujeres tienen prohibido usar pantalones, según estableció por decreto el municipio, liderado por el Partido de la Reforma. Si bien la ciudad vive en paz y en armonía con todos los residentes, incluso con ateos (los menos), cada cierto tiempo se ven enfrentados con el Instituto Nacional de la Salud Pública (RIVM) de Holanda por una controvertida decisión: no usar vacunas.

[\[Más información\]](#)

A propósito de la muerte de Anne a causa de la varicela

27/03/2014

El desgraciado fallecimiento de la niña de tres años de Puebla de Arganzón a consecuencia de una complicación de la varicela pone de nuevo de actualidad el asombroso caso de la vacunación de esta enfermedad en nuestro país desde agosto. El Comité de expertos de la Asociación Española de Pediatría publicó en enero (como todos los años) el calendario de vacunas que es aconsejable para nuestros niños, e incluye la vacuna de la varicela con una primera dosis entre los doce a quince meses y una segunda dosis entre los dos a tres años.

Desde agosto del 2013, la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad bloqueó el abastecimiento a las farmacias de la vacuna (a excepción de Navarra, Ceuta, Melilla y, hasta diciembre, Madrid) en base a un supuesto riesgo de que se iba a cambiar el patrón epidemiológico de la enfermedad desplazándola hacia edades más adultas y que iban a aumentar

los casos de herpes. Es una hipótesis teórica que, por ahora, no tiene una justificación real, ni de peso. Países con más tiempo vacunando como EE. UU. o, en Europa, como Alemania y Francia, donde se sigue vacunando a estas edades, no han comunicado nada a este respecto. Cuando presumimos de que nuestra sanidad es universal, gratuita e igual para todos ¿qué pasa?.

[\[Más información\]](#)

Los farmacéuticos alertan de que es ilegal vender vacunas por correo

27/03/2014

La dispensación por correo de la vacuna de varicela es “ilegal” y supone una infracción grave para el farmacéutico que la realice. Así de contundente se mostró ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, Carlos García Pérez-Teijón, cuando se le preguntó sobre la situación que se está produciendo en Salamanca, en la que padres salmantinos piden por teléfono vacunas de varicela a farmacias navarras y estas luego mandan las dosis manteniendo la cadena de frío a los domicilios de los clientes.

[\[Más información\]](#)

Muestra temporal en Sevilla para la prevención de la meningitis y la sepsis

27/03/2014

La presidenta de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis (FIMM), Elena Moya, y el concejal delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, han presentado en el palacio de los Marqueses de La Algaba el programa de información y prevención contra la meningitis y la sepsis que promueve esta fundación. De la mano del presidente del comité científico de este programa, Juan Ruiz Canela, han manifestado la necesidad de conocer y prevenir la meningitis y la sepsis siendo “imprescindible el establecimiento de un calendario único de vacunación en España”, al tratarse de “la medida más eficaz para combatir esta grave enfermedad en todas sus variantes”. Al mismo tiempo, la FIMM tiene entre sus objetivos la implementación en la Sanidad andaluza de la Primera Guía de la Prevención de la Meningitis, que publicó el pasado año 2013, un documento informativo dirigido a los profesionales de la sanidad.

[\[Más información\]](#)

Sendín señala que hay “muchos intereses” sobre el uso de

vacunas

27/03/2014

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha reconocido que el uso de las vacunas suele generar “muchísima ansiedad” y es un tema “sobre el que hay muchos intereses creados”, al ser preguntado por las críticas que muchos pediatras están haciendo a la decisión del Ministerio de Sanidad de prohibir la venta libre en farmacias de la vacuna de la varicela. De hecho, ha reconocido que el Consejo Asesor del Departamento de Ana Mato ha puesto en marcha un grupo de trabajo, que será coordinado por él mismo, a propósito de las vacunaciones para “mirar con lupa” todo lo concerniente al uso de estos productos en España, después de que el año pasado las comunidades y el Ministerio acordaran un calendario común de vacunación infantil. Dicho acuerdo, sin embargo, ha sido criticado por numerosas asociaciones de Pediatría que lo consideran “de mínimos”, así como la decisión posterior de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de impedir la venta libre en farmacias de la vacuna de la varicela.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)[\[Más información\]](#)

Prevenar en mayores

27/03/2014

El laboratorio Pfizer ha comunicado que su ensayo clínico en mayores de 65 años con la vacuna Prevenar ha arrojado resultados muy satisfactorios. Los que recibieron la vacuna tuvieron un 46% menos de primeros episodios de neumonía comunitaria por tipos vacunales al compararla con los que recibieron placebo. Además los voluntarios vacunados tuvieron

un 45% menos primeros episodios de neumonía no invasora-no bacteriémica por tipos vacunales ($p=0.0067$) y un 75% menos de primeros episodios de enfermedad invasora vacunal ($p=0.0005$), comparados con placebo. Los pacientes mantuvieron estas reducciones de enfermedad hasta cuatro años tras la vacunación.

[\[Más información\]](#)