

Pauta de vacunación antineumocócica 2+1 y protección comunitaria

15/11/2012

Palabra clave: Neumococo

Respuesta de José Antonio Navarro (15 de noviembre de 2012)

Administración simultánea de vacunas atenuadas

15/11/2012

Palabra clave: Administración y logística vacunal

Respuesta de José Antonio Navarro (05 de Noviembre de 2012)

Campaña de vacunación antigripal

15/11/2012

Para proteger a los pacientes, «todos los trabajadores de salud deben vacunarse contra la gripe». "Cada temporada, el 20% de los trabajadores de la salud padece gripe y muchos de ellos pueden diseminar el virus a los pacientes. Ya es hora de que todas las personas que trabajan en una institución de atención de salud se vacunen", señala un editorial del

Canadian Medical Association Journal. En Canadá, cada año hay aproximadamente 20.000 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y se calcula que entre 4.000-8.000 muertes pueden ser atribuidas a la enfermedad. Sin embargo, el 55% de los médicos no se vacuna contra la gripe y pone a los pacientes en riesgo de enfermedad y muerte. El editorial sostiene que la vacunación contra la gripe para los trabajadores de salud debe ser obligatoria, aunque podría haber excepciones por razones médicas o religiosas. "Se necesita una tasa de vacunación por encima del 90% para prevenir los brotes en los hospitales".

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)
[información\]](#)
[\[Más información\]](#)

Desfinanciación la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente en Madrid

15/11/2012

Tras la desfinanciación de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente por parte de la Comunidad de Madrid, "probablemente se pierda" la reducción de la enfermedad por neumococo en todas sus formas conseguida en los últimos años, lo que aumentará su incidencia. Así lo han afirmado los especialistas en la reunión 'Un nuevo reto en la prevención de la enfermedad neumocócica en la Comunidad de Madrid', que ha organizado Pfizer en la capital, a la vez que han añadido que se perderá la inmunidad de grupo existente en esta comunidad. Para ello, se han valido de los datos del estudio 'Heracles', que se ha desarrollado en esta comunidad autónoma.

Recomendaciones ECDC para vacunación antigripal en niños y embarazadas

15/11/2012

El ECDC acaba de publicar un “consejo científico” acerca de la vacunación antigripal en niños menores de 18 años y en embarazadas, basado en una revisión sistemática de la literatura y en las opiniones de expertos independientes, que no suponen unas recomendaciones sino una guía que ayude a los Estados Miembros a producir sus propias recomendaciones. Elabora cuatro apartados con pros y contras de: a) vacunación universal de niños de 6 meses a 18 años, b) vacunación universal de niños de 6 meses a 4 años, c) vacunación universal de niños de 6 meses a 18 años con factores de riesgo, y d) vacunación antigripal anual a la embarazada sin contraindicaciones.

[\[Más información\]](#)

Indemnización por efectos adversos de la vacuna de la

gripe

15/11/2012

El Servicio Catalán de Salud deberá indemnizar a José Juan S.A. con 468.699 euros porque la vacuna de la gripe le produjo un raro síndrome como consecuencia del cual quedó inválido en un 85 % de su cuerpo, según una sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado 19 de octubre. La sentencia establece que "el daño causado no dimana" de las "técnicas sanitarias" aplicadas por el Servicio Catalán de Salud, que fueron las conocidas por la ciencia y "razonablemente disponibles en el momento", es decir, que no hubo mala praxis médica. Además, establece también que no hubo una mala información al paciente, dado que el síndrome que le afectó, como consecuencia de la vacuna, es tan raro que no era razonable esperar que se le informara de esa lejana posibilidad por parte de los médicos que le administraron la vacuna. El reclamante, que quedó inválido por un desorden neurológico, por un riesgo propio del medicamento o por una excepcional reacción autoinmune, pero en cualquier caso como consecuencia de la administración de la vacuna, "no tiene el deber jurídico de soportar de manera individual" esta carga social "que ha de ser compartida por el conjunto de la sociedad", dice el Supremo.

[Más información]

Vacunación contra la tos ferina en el embarazo

15/11/2012

El ACIP en su reunión de octubre 2012 ha recomendado por

aplastante mayoría de sus miembros que todas las embarazadas reciban la vacuna dTpa en cada uno de los embarazos. Por otra parte también ha aprobado que si las madres no reciben la vacuna durante la gestación, lo hagan en el postparto inmediato antes de abandonar el hospital. Con la vacunación materna se consigue que los anticuerpos generados por la madre pasen transplacentariamente al recién nacido proporcionándole protección desde el nacimiento. También ha recomendado el uso de la vacuna de GlaxoSmithKline, MenHibrix, que contiene H. influenzae y polisacáridos capsulares de meningococo C e Y, en niños de riesgo de hasta 18 años.

[\[Más información\]](#)

Vacunarse de la gripe evita un 80 por ciento de las hospitalizaciones en los diabéticos

15/11/2012

La vacunación puede evitar hasta cerca de un 80 por ciento de las hospitalizaciones derivadas de las consecuencias de la gripe en las personas con diabetes. Así lo han constatado los especialistas de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y del Grupo de Estudio de la Gripe (GEG), que han hecho hincapié en la importancia de la inmunización antigripal en este grupo de riesgo para que pueda protegerse de la infección y de sus complicaciones. La gripe puede alterar los niveles de glucosa en las personas con diabetes ya que en algunas ocasiones se acompaña de vómitos y diarreas, y de ahí la necesidad de

incentivar más la inmunización entre este colectivo que no obstante es uno de los grupos de riesgo más concienciados con la vacunación. En la pasada campaña se vacunaron el 76,5% de los diabéticos mayores de 65 años y el 47,5% de los menores de 65. Según los especialistas, en la diabetes se da un círculo vicioso en el que la hiperglucemia debilita las funciones inmunes del organismo y aumenta por tanto la posibilidad de infección. Pero, al mismo tiempo, la infección puede incrementar la glucemia en los pacientes.

[Más información]

La vacuna del VPH no aumenta las ETS

15/11/2012

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Emory en Atlanta (EE.UU.) ha demostrado que la administración de la vacuna no aumentó entre las adolescentes la aparición de enfermedades de transmisión sexual (ETS) o el número de embarazos. El estudio, publicado en *Pediatrics*, demuestra que la preocupación de los padres a que sus hijas puedan, tras recibir la vacuna, aumentar sus relaciones sexuales de riesgo, podría ser infundada. «Algunos padres han expresado una preocupación», ha explicado Saad Omer, uno de los investigadores de enfermedades infecciosas y vacunas de la Universidad que desarrolló el estudio. «Los padres pueden estar tranquilos por lo menos sobre la base de la evidencia de que las jóvenes que reciben vacunas no mostraron signos de aumento en los resultados clínicos de actividad sexual», ha añadido.

[\[Más información\]](#)

Afectadas por la vacuna contra el virus del papiloma

15/11/2012

La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) ha pedido al Ministerio de Sanidad la retirada del tratamiento contra el virus del papiloma humano (VPH) del calendario vacunal de las niñas y la creación de un fondo de compensación para las personas que sufren efectos secundarios. El coordinador del Grupo Español de Consenso sobre Vacunas del Virus del Papiloma Humano, Javier Cortés, ha asegurado que "ningún efecto adverso grave" que ha aparecido en una persona vacunada contra el virus del papiloma humano, incluyendo los casos de fallecimiento, ha estado relacionado "causalmente" con la inmunización y que son "asociaciones temporales". "Respeto la libertad de expresión que tienen estos ciudadanos", ha explicado Cortés, a la par que ha transmitido el convencimiento que tiene la comunidad científica internacional de que se trata de una inmunización "altamente eficaz altamente segura y altamente recomendable". "Nadie en la comunidad científica internacional se está planteando retirar la vacuna de los calendarios. Estamos convencidos de que la vacunación contra el virus del papiloma humano es un paso adelante en prevención de un volumen de enfermedad, que amenaza seriamente a la salud de las mujeres y a los hombres", ha señalado. Recientemente, 15 asociaciones médicas y científicas salieron en defensa de la eficacia y seguridad de la inmunización, tras el reciente fallecimiento de una joven asturiana, acaecida después de haber sido vacunada frente al VPH, y que está siendo investigado por las Autoridades Sanitarias del Principado de Asturias y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

[Más información] [\[Más información\]](#)