

# Vacunas contra un brote controlado de hepatitis A en Granada

27/12/2011

Unos 800 vecinos de la calle Rey Badis en el barrio de Almanjáyar han sido vacunados contra la hepatitis A tras registrarse un foco de ocho contagios entre niños de esta zona. La delegación provincial de Salud solo contabilizó un caso el pasado año. De momento, el brote ha comenzado a remitir, y Salud lo da por controlado, una vez que han sido adoptadas todas las medidas profilácticas al alcance de los profesionales sanitarios.

[\[Más información\]](#)

---

## Más del 97% de los menores de seis años cumple el calendario vacunal

27/12/2011

Más del 97 por ciento de los menores de seis años de la Comunitat de Valencia cumplen el calendario vacunal, según ha señalado el director general de Investigación y Salud Pública, Manuel Escolano, en la presentación de una guía de vacunación para padres y madres con información útil sobre las vacunas de sus hijos. Esta publicación, que estará disponible en el portal [www.cuidatecv.es](http://www.cuidatecv.es) y en el portal [www.sp.san.gva.es](http://www.sp.san.gva.es), quiere ser una herramienta útil, clara y de fácil manejo para

solucionar cualquier duda sobre vacunas que puedan tener los padres valencianos., según han destacado desde la Generalitat. La Guía se divide en varios apartados, entre los que destaca el de "preguntas frecuentes", en las que se responde a cuestiones relacionadas con las vacunas y la vacunación como cuáles son los tipos de inmunidad, cuál el calendario vacunal o sobre la seguridad de las vacunas. Otros apartados de esta Guía están destinados a explicar cuáles son las vacunas incluidas en el calendario de vacunación infantil, aclarando dudas al respecto de su seguridad y contraindicaciones.

[\[Más información\]](#)

---

## **La gripe A causa el 13,6% de los casos de gripe en España**

27/12/2011

Los datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, muestran una intensidad gripal baja en todas las comunidades, con una tasa global de apenas 23,48 casos por cada 100.000 habitantes en la semana, del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Este otoño la intensidad gripal está siendo leve. Por comunidades, la más castigada es Canarias, con 72,5 casos por 100.000 habitantes, seguida de Ceuta (68,4), Asturias (51,7), Cataluña (50,6), Castilla-La Mancha (42,6) y Melilla (28,7). La actividad gripal en Europa está siendo también leve. Ya por debajo de la media nacional están País Vasco (21,4), Madrid (21), Comunidad Valenciana (17), Aragón (14,9), La Rioja (13,4), Andalucía (12,6), Navarra (10,3), Castilla y León (10,3), Baleares (7,5) y Cantabria (7,4), mientras que de Galicia, Murcia y Extremadura no tienen datos

precisos. Por grupos de edad, se observa una tendencia creciente en las tasas de incidencia de gripe correspondientes a menores de 15 años, aunque sin cambios estadísticamente significativos. La actividad gripal en Europa está siendo también leve, como demuestra que sólo se hayan confirmado doce casos graves y un fallecimiento por gripe desde primeros de octubre

[\[Más información\]](#)

---

## **Comienza la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano**

27/12/2011

La Junta de Castilla y León iniciará la campaña regional 2011-2012 de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), dirigida a las niñas de la Comunidad que cumplen 14 años a lo largo del próximo año, y cuyo objetivo es prevenir los problemas de salud derivados de este virus, entre los que destaca el cáncer de cuello de útero. Según informaron a Europa Press fuentes de la Junta, esta enfermedad suele adquirirse por transmisión sexual y presenta una mayor tasa de riesgo entre la población joven, especialmente en las edades posteriores al inicio de las relaciones sexuales, entre los 15 y los 25 años, y la mejor manera de prevenirla es a través de la vacunación.

La población diana de esta medida profiláctica son las niñas de la Comunidad que cumplan catorce años durante el año 2012 –nacidas en 1998– y que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son un total de 9.979. Este

año, además, la Junta ofrece la posibilidad de que se reincorporen a la vacunación aquellas adolescentes nacidas a partir de 1994, que aún no hayan cumplido los 18 años y que no iniciaron o no completaron en las campañas anteriores las tres dosis que componen la vacuna frente al VPH, las cuales podrán solicitar cita en su centro de salud.

[\[Más información\]](#)

---

## **Paciente con ARJ en tratamiento con DMARDs biológicos**

27/12/2011

Palabra clave: Situaciones Especiales

Respuesta de José Antonio Navarro (14 de diciembre de 2011)

---

## **Extremadura adelanta la vacunación del sarampión**

27/12/2011

El pasado mes de mayo el Servicio Extremeño de Salud anunció un brote de sarampión en la región. La incidencia de esta enfermedad de carácter vírico, que junto a la varicela es de las más contagiosas que existen, pasó de registrar entre cero y dos casos a 145 en lo que va de año, según datos de la dirección general de Salud Pública de la Junta de Extremadura.

La situación ha obligado a tomar medidas coyunturales, aunque no permanentes. El consejo asesor de vacunas del SES ha decidido adelantar la primera dosis de la triple vírica, que es la vacuna que inmuniza contra esta enfermedad, de los 15 a los 12 meses y la segunda, de los seis a los cuatro años, según puntualiza Juan Luis Cordero, director general de Salud Pública, que reconoce que el cambio no es el ideal, sin embargo.

[\[Más información\]](#)

---

## **El Colegio de Médicos de Madrid apoya el adelanto de vacuna triple vírica**

27/12/2011

El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) apoya la recomendación de la Consejería de Sanidad de adelantar la vacunación de la triple vírica a los 12 meses y recuerda que los niños de más de 4 años deben tener dos dosis de dicha vacuna, "por lo que hay que estar atentos también a esta segunda toma". Ante el aumento de brotes de sarampión detectados en los últimos meses en España, la Consejería de Sanidad ha recomendado el adelanto de esta vacuna a los 12 meses. Este rebrote es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el sarampión es una enfermedad que se creía extinguida en España.

[\[Más información\]](#)

---

# Vacuna frente a hepatitis B en diabéticos

27/12/2011

El ACIP en su última reunión del pasado octubre ha recomendado la vacunación frente a la hepatitis B a los diabéticos de menos de 60 años. Los expertos votaron a favor tras el estudio de varios trabajos que muestran que los diabéticos tienen el doble de posibilidades de contraer la infección respecto de los individuos sanos. No obstante no se confirmaron estos hallazgos en los mayores de 60 años. Se piensa que el mayor riesgo de contraer la infección proviene de la necesidad de la vigilancia periódica de los controles de glucosa sérica.

[\[Más información\]](#)

---

# Vacuna antinicotina

27/12/2011

La compañía Nabi Biopharmaceuticals ha sufrido un duro revés al fracasar la segunda parte del ensayo clínico fase III que estaba realizando con su vacuna antinicotina, NicVAX, ya que los datos mostraron que no se cumplió el end-point primario al no existir diferencias significativas entre los grupos vacunales y el placebo. Estos resultados son similares a los obtenidos en otro estudio fase III que se dieron a conocer en Julio de 2011. El laboratorio había llegado a un acuerdo con GlaxoSmithKline por valor de 40 millones de dólares para que éste se beneficiara de la vacuna y de la tecnología

resultante. Por otra parte se mantiene el ensayo en el que se combina NicVAX y vareniclina, que se está llevando a cabo en Holanda y del que se esperan resultados para el segundo semestre de 2012.

[Más información]

---

## **Vacuna antigripal y obesidad**

27/12/2011

Un reciente estudio de la University of North Carolina at Chapel Hill sugiere que los individuos con sobrepeso pueden tener una respuesta alterada a la vacuna antigripal. El estudio demostró que los obesos tuvieron una caída más rápida de anticuerpos postvacunales. La investigadora principal, Melinda Beck, comentó que los resultados sugieren que los sujetos con sobrepeso tienen más probabilidades de padecer una infección gripal tras contactar con el virus respecto de los que no lo son. Los hallazgos de han publicado en la revista International Journal of Obesity.

[\[Más información\]](#) [Más información]