

# El sarampión y la rubéola se disparan en España

13/06/2011

Enfermedades como el sarampión y la rubéola están ganando sitio en España. Si en 2004 tan sólo se registraron dos casos, en 2010 se detectaron hasta 1.300 lo que ha puesto en alerta a los servicios sanitarios. Los expertos estiman que para frenar la transmisión del sarampión y la rubéola es necesaria una cobertura vacunal infantil de más del 95%, según recoge El País. Y es que si bien la primera dosis de la vacuna supera el 90%, la segunda dosis disminuye muy significativamente. Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma que más casos ha registrado alcanzando los 541 casos de sarampión. Con un centenar de hospitalizados, las autoridades han incorporado una nueva dosis de vacuna a los seis meses allí donde ha habido varios casos y han adelantado la primera dosis a los 12 meses para todos los niños. Estas medidas ya fueron tomadas en Canarias y Cataluña.

[Más información]

---

## UNICEF administró en 2010 más de 2.500 millones de vacunas a niños

13/06/2011

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) administró en 2010 más de 2.500 millones de dosis de vacunas para niños en 99 países, lo que representa el 58 por ciento de

los niños del mundo, en el marco de una campaña que ha tenido un coste de 522 millones de euros. UNICEF ha explicado que la adquisición de vacunas el año pasado ha sido la mayor que ha realizado en su historia y ha subrayado que esta campaña de vacunación es "fundamental" para apoyar los programas de supervivencia infantil. El Fondo Naciones Unidas para la Infancia ha explicado que ha decidido hacer públicos los precios de las vacunas que ha administrado para cumplir con su compromiso de ofrecer la "máxima transparencia" en las labores que realiza.

La tabla de precios de las vacunas consta en su página web oficial ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)). Como la principal fuente de financiación de las vacunas adquiridas por UNICEF, la Alianza GAVI cree firmemente en la difusión de información oportuna, transparente y precisa sobre precios", ha afirmado la directora general interna de la Alianza GAVI, Helen Evans.

[\[Más información\]](#)

---

## **Confirman la eficacia de la vacuna del virus del papiloma en mujeres adultas**

13/06/2011

Un estudio realizado en cerca de 4.000 mujeres de entre 25 y 45 años ha demostrado que la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano (VPH) también es eficaz en mujeres adultas. El estudio, que publica el 'British Journal of Cancer', ha estado coliderado por el Instituto Catalán de Oncología (ICO-Idibell), y es el primero que demuestra la eficacia de la prevención en mujeres mayores de 26 años. La

investigación, encabezada por el investigador de la Unidad de Infecciones y Cáncer del ICO-Idibell, se ha realizado durante cuatro años en 4.000 mujeres, a la mitad de las cuales se les dio la vacuna y al resto un placebo. Tras la aplicación de la vacuna se les hizo un seguimiento de la cantidad de anticuerpos desarrollados, las infecciones por VPH, las lesiones preneoplásicas y las verrugas genitales.

[\[Más información\]](#)

---

## **Posición del bisel de la aguja en las vacunas de administración subcutánea**

13/06/2011

Palabra clave: Administración y logística vacunal

Respuesta de José Antonio Navarro (1 de Junio de 2011)

---

## **Vacunas y tratamiento con Ustekinumab**

13/06/2011

Palabra clave: Situaciones Especiales

Respuesta de José María Bayas (30 de Mayo de 2011)

---

# **Vacunación previa al inicio de tratamiento inmunosupresor en enfermedad de Crohn**

13/06/2011

Palabra clave: Situaciones Especiales

Respuesta de José Antonio Navarro (25 de Mayo de 2011)

---

# **Vacunación frente a rotavirus y excreción vírica**

13/06/2011

Palabra clave: Rotavirus

Respuesta de José Antonio Navarro (23 de Abril de 2011)

---

# **Cataluña hará constar por escrito si un padre rechaza las vacunas**

13/06/2011

Los padres que decidan no vacunar a sus hijos en Cataluña

deberán firmar un documento en el que conste que han sido informados de los riesgos que esa decisión puede comportar para la salud de su prole. La Generalitat ha tomado esta decisión alarmada por el repunte de enfermedades como la tos ferina y el sarampión. Según el Departamento de Salud, se trata de un documento informativo para los profesionales, y no de un registro. Los profesionales recordarán a los padres los problemas que puede ocasionar su decisión, no solo para sus hijos, sino para el conjunto de la comunidad en la que viven. El sarampión repunta en España -más de 600 casos este año- y los expertos denuncian que los padres partidarios de la no vacunación tienen buena parte de culpa.

[\[Más información\]](#) [\[Más información\]](#)

---

## Caso de difteria en Francia

13/06/2011

Publicado en Euro Surveill (2011;16(19):pii=19867) y comentado en el apartado de bibliografía de este mes, el caso por el que el 14 de marzo de 2011 el French Institute for Public Health fue informado por la Agencia Regional de Languedoc-Rousillon de un aislamiento de *Corynebacterium diphtheriae* en un paciente con amigdalitis y pseudomembranas. El sujeto carecía de historia de vacunación y de viajes recientes a zonas endémicas. La evolución con tratamiento antibiótico fue buena, negativizándose el cultivo a los seis días de comenzado el mismo. Se identificaron 53 contactos próximos a los que se les recogió frotis nasofaríngeo y profilaxis antibiótica. Todos ellos fueron negativos, excepto la pareja del caso índice que era portadora asintomática y había sido vacunada con DTP en 2006 por lo que recibió una dosis de recuerdo y azitromicina durante 3 días. Al haber asistido al Carnaval de Sitges días

antes del proceso, es posible que la transmisión hubiera tenido lugar en ese evento. Estos casos suponen la primera notificación de *C. diphtheriae* en Francia desde 1989.

[\[Más información\]](#)

---

## Reaparición del sarampión en Cataluña

13/06/2011

Los casos de sarampión en Cataluña se han incrementado, a pesar de que se puede prevenir con una vacuna, según ha alertado el Departamento de Salud en un comunicado en el que ha cifrado en 80 los enfermos contabilizados en el mes de marzo, la mayoría adultos sin vacunar. Desde Salud se ha señalado que una tercera parte de los casos de sarampión confirmados ha requerido hospitalización, y que todos ellos eran jóvenes, que es donde el riesgo de complicaciones es más elevado, y que todos han evolucionado bien. Ante esta situación, las autoridades sanitarias aconsejan a los ciudadanos mantener una buena cobertura de la vacuna y que, según el calendario vigente, se tomen las dosis correspondientes de la vacuna triple vírica (sarampión, parotiditis y rubéola) a los 12 meses y a los 4 años.

[\[Más información\]](#)