

Monaco

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Mónaco 2012 | BCG | Bacilo Calmette Guérin | al nacimiento |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina acelular | >= 2 meses* |
| | VHB | Hepatitis B | >=2 meses*, 5 meses, 1 año |
| | Hib | Haemophilus influenzae | >= 2 meses* |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 1, 3-6 años |
| | VPI | Polio oral inactivada | >= 2 meses* |
| | MenC | Meningococo C conjugada | 2 años |
| | Np | Neumococo de polisacaridos | 2 meses |

*DTPa, VPI, VHB y Hib se administran como vacuna hexavalente

San Marino

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

| | | | |
|--------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|
| San Marino 2012 | DTP | Difteria, tétanos y tos ferina | 3, 5, 11-12 meses, 5-7 años |
| | VHB | Hepatitis B | 3, 5, 11 meses |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 3, 5, 11-12 meses |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 15 meses, 10 años |
| | VPI | Polio inactivada | 3, 5, 11-12 meses, 5-7 años |
| | HPV | Papilomavirus | Mujeres de 11 años. 3 dosis |
| | Td | Tétanos y difteria para adultos | 15-16 años |
| | dTpa | Tétanos, dif. y pert. acelular | 25-26 años |

Andorra

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

| | | | |
|-----------------|------|---|---------------------------|
| Andorra 2011 | DTP | Difteria, tétanos y tos ferina | 2, 4, 6, 18 meses, 5 años |
| | HepB | Hepatitis B | RN, 2, 6 meses |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 2, 4, 6, 18 meses |
| | VPI | Polio inactivada | 2, 4, 6, 18 meses |
| | MeC | Meningococo C | 2, 4, 18 meses |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 15 meses, 5 años |
| | dTpa | Tétanos, difteria y tos ferina de adultos | 15 años |
| | Nc13 | Neumococo conj. 13-valente | 3, 5, 15 meses |

[Calendario de vacunación infantil en el Gobierno de Andorra 2011](#)

España

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

| | | | |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| España sep/08 | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina | 2, 4, 6, 15-18 meses, 4-6 años |
| | VHB | Hepatitis B | RN, 1-2, 6 ó bien 2, 4, 6 meses |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 2, 4, 6, 15-18 meses |
| | MeC | Meningococo C | 2, 4-6, 12-18 meses |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 12-15 meses, 3-6 años |
| | VPI | Polio inactivada | 2, 4, 6, 15-18 meses |
| | Var | Varicela | 10-14 años* |
| | Td | Tétanos y difteria para adultos | 13-16 años |
| | VPH | Papilomavirus | mujeres de 11-14 años, 3 dosis (0,1-2,6 meses) |
| | * Si no han sido vacunados antes ni han padecido la varicela | | |

Portugal

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

| | | | |
|------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Portugal 2012 | BCG | Tuberculosis | Recién nacido |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina | 2*, 4*, 6*, 18** meses, 5-6+ años |
| | VHB | Hepatitis B | Recién nacido, 2, 6 meses |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 2*, 4*, 6*, 18** meses |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 15 meses, 5-6 años |
| | VPI | Polio inyectable | 2*, 4*, 6* meses, 5-6+ años |
| | MeC | Meningococo C | 12 meses |
| | Td | Tétanos y difteria de adultos | 10-13 años. Recuerdo cada 10 años |
| | VPH | Papilomavirus | Mujeres a los 13 años. 3 dosis |

*DTPa, Hib y VPI se administran en una inyección

** DTPa y Hib se administran en una inyección

+DTPa y VPI se administran en una inyección

[Programa nacional de vacunación portugués 2012](#)

Bosnia-Herzegovina

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|----------------------------|--------|---|--|
| Bosnia-Herzegovina 2012 | BCG | Bacilo Calmette Guérin | al nacimiento |
| | DT | Tétanos y difteria dosis infantil | 6 años |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina acelular | 3, 4, 6 meses, 5 años (en algunas regiones) |
| | VHB | Hepatitis B | al nacimiento, 1-2, 6 meses (en algunas regiones) |
| | Hib | Haemophilus influenzae b | 2-3, 3-5, 18 meses, 2 años |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 18 meses, 2 años (en algunas regiones) |
| | VPI* | Polio inactivada | 2, 4, 6 meses, 5 años (en algunas regiones) |
| | VP0 | Polio oral | 3, 4, 5-6, 18-24 meses, 5-7, 14 años (en algunas regiones) |
| | Rub | Rubéola | 13 años (en algunas regiones) |
| | Td | Tétanos y difteria para adultos | 14 años (en algunas regiones) |
| | TT | Toxoide tetánico | 18 años (en algunas regiones) |

*En algunas regiones se administra conjuntamente DTaP y VPI con la pauta 2, 4, 6 meses y 5 años o conjuntamente DTPa, Hib

y VPI con la pauta 3, 4, 5 meses.

Croacia

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|-----------------|--------|--|---|
| Croacia 2011 | BCG | Bacilo Calmette Guérin | al nacimiento, 13 años si PPD neg. |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina acelular | 2, 4, 6, 12 meses, 3 años |
| | HepB | Hepatitis B | Al nacimiento, 2 ,6 meses. 12 años(0,1,6) si no vacunado. |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 2, 4, 6, 12 meses |
| | VPI | Polio inactivada | 2, 4, 6, 12 meses, 7, 14 años |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 12 meses, 6 años |
| | Td | Tétanos y difteria para adultos | 7, 14, 18 años |

[Calendario de vacunación de Croacia 2011](#) (Croata)

Rumania

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|-------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| Rumania jul/11 | BCG | Tuberculosis | Recién nacido |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina | 2, 4, 6, 12 meses, 4 años |
| | Hib | Haemophilus influenzae b | 2, 4 ,6 ,12 meses |
| | VHB | Hepatitis B | Al nacimiento, 2, 6 meses |
| | VPI | Polio inyectable | 2, 4, 6, 12 meses, 9 años |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 12 meses, 7 años |
| | Td | Tétanos y difteria para adultos | 14 años |

Programa nacional de vacunación en Rumanía 2011

Eslovenia

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

| | | | |
|-------------------|------|------------------------------------|--|
| Eslovenia 2012 | BCG | Tuberculosis | RN de riesgo* |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina | 3**, 4-5**, 6**, 12-24** meses |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 3**, 4-5**, 6**, 12-24** meses |
| | VPI | Polio inyectable | 3**, 4-5**, 6**, 12-24** meses, 8 años |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 12-18 meses, 5-6 años |
| | VPH | Hepatitis B | 5-6 años (3 dosis) |
| | dTap | Tétanos, difteria y pert. acelular | 8 años |
| | T | Tétanos | Recuerdo cada 10 años |
| | HPV | Papilomavirus | Mujeres de 11-12 años |

*Recién nacidos de madres que inmigraron los 5 años previos de países endémicos

**DTPa, Hib y VPI se administra como vacuna pentavalente.

Hungría

06/09/2006

| País | Código | Descripción | Pauta |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

| | | | |
|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------|
| Hungría ene/13 | BCG | Tuberculosis | Recién nacido |
| | DTPa | Difteria, tétanos y tos ferina | 2, 3, 4, 18 meses, 6 años |
| | Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 2, 3, 4, 18 meses |
| | VPI | Polio inactivada | 2, 3, 4, 18 meses, 6 años |
| | Nc13 | Neumococo conj. 13-valente | 2, 4, 15 meses |
| | SRP | Sarampión, rubéola y paperas | 15 meses, 11 años |
| | Td | Tétanos y difteria adultos | 11 años |
| | VHB | Hepatitis B | 14 años (3 dosis) |

[Programa de vacunación húngaro 2013](#) (húngaro)