

# Penfigoide postvacunal

# ampollosa

28/05/2010

**Respuesta del Experto a ...**

Penfigoide ampollosa postvacunal.

## **Pregunta**

Lactante de 4 meses que tras segunda dosis vacunal del calendario vigente , presenta lesiones ampollasas de predominio palmo plantar que tras biopsiar al persistir , se pone de manifiesto depósitos C3 e IgG mediante inmunohistoquímica compatible con penfigoide ampollosa. ¿Se pone la siguiente dosis vacunal? Me gustaría saber vuestra opinión respecto a este caso. Gracias.

## **Respuesta de José Antonio Navarro (28 de Mayo de 2010)**

El penfigoide ampollosa es una enfermedad autoinmune de adultos-ancianos aunque excepcionalmente se aprecia en la infancia asociado a medicación o a recepción de vacunas (1-3). La opinión más extendida es que la vacuna sería un factor que desenmascara un penfigoide ampollosa subclínico mediante una respuesta inmune inespecífica y no un factor desencadenante. Siendo en la infancia el pronóstico muy favorable y dado el buen control de un hipotético segundo episodio con tratamiento esteroideo nuestro consejo sería, teniendo en cuenta los riesgos de la no vacunación, el de continuar con la pauta vacunal habitual.

## **Bibliografía**

1. Baykal C et al. Childhood bullous pemphigoid developed after the first vaccination. J Am Acad Dermatol 2001;44:S348-S350
2. Erbagci Z et al. Childhood bullous pemphigoid following

hepatitis B immunization. J Dermatol 2002;29:781-785 3. Mérida C et al. Penfigoide ampoloso en lactante tras vacunación. Actas Dermosifilogr 2005;4:255-257.