

Precauciones tras recepción de VPO en contacto de VIH positivo

07/07/2011

Respuesta del Experto a ...

Precauciones tras recepción de VPO en contacto de VIH positivo

Pregunta

Estimado Colega: Me gustaría conocer su opinión acerca de la conducta a tomar ante un paciente vacunado por error con OPV (tiene conviviente VIH +). Además de evitar el contacto con excretas del pac deben tomarse otros recaudos?. ¿Existe riesgo por vía inhalatoria?. Desde ya muchas gracias. Cordialmente, Dra. Deluca.

Respuesta de José Antonio Navarro (07 de Julio de 2011)

No debe de adoptar ninguna conducta especial, excepto evitar el contacto íntimo durante las 4-6 semanas posteriores a la vacunación. Si no es posible adoptar esta medida, deberá mantener una higiene rigurosa incluido el lavado de manos tras el contacto con heces y evitar el contacto con saliva (compartir alimentos o útiles de cocina) (1).

Referencias

1. Centers for Disease Control and Prevention. Poliomyelitis prevention in the United States: introduction of a sequential vaccination schedule of inactivated poliovirus vaccine followed by oral poliovirus vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1997;46(No. RR-3).