

Publicados en la web del Ministerio de Sanidad los documentos de vacunación frente a rotavirus y el nuevo esquema de vacunación frente a VPH

20/02/2024

En la página web del Ministerio de Sanidad acaban de publicarse los dos últimos documentos elaborados por la Ponencia de Vacunas y concretamente los referidos a: [“Documento de recomendaciones de vacunación frente a rotavirus”](#) y [“Documento de recomendaciones vacunación de VPH. Revisión de la estrategia de 1 dosis”](#).

En cuanto al documento de la vacunación frente a rotavirus, en síntesis, las recomendaciones son: a) se recomienda la vacunación frente a RV en lactantes a partir de las 6 semanas de vida, b) se puede utilizar cualquiera de las dos vacunas disponibles. En lactantes con edad gestacional inferior a la que figura en las fichas técnicas (≥ 25 semanas en RV5; ≥ 27 semanas en RV1), se podrán administrar contando con el consentimiento informado de los progenitores o tutores legales, y c) se recomienda establecer un sistema de vigilancia de la enfermedad por RV que incluya la caracterización microbiológica continuada para evaluar el impacto de la introducción de la vacunación en la enfermedad y detectar posibles cambios en los genotipos circulantes de los RV. Y en cuanto al papilomavirus humano, las recomendaciones son:

– Vacunación sistemática de niñas y niños a los 12 años. Pauta de 2 dosis separadas al menos 6 meses.

– Captación de las mujeres no vacunadas hasta los 18 años y de varones no vacunados a partir de la fecha de introducción en el calendario de vacunación. Pauta de 2 dosis separadas al menos 6 meses.

– Personas no vacunadas con determinadas situaciones de riesgo. Pauta de 2 dosis separadas al menos 6 meses:

. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hasta los 25 años (incluidos).

. Situación de prostitución, hasta los 25 años (incluidos).

– En personas con inmunosupresión y hasta los 45 años (incluidos), se recomienda siempre una pauta de 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses), independientemente de la edad de comienzo de la vacunación incluyendo:

. Síndrome WHIM (IDP): vacuna que cubra tipos 6 y 11.

. Infección por VIH.

. Trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos.

– Mujeres, independientemente de la edad, que hayan recibido cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN2+). Pauta de 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses).