

Reacciones adversas tras vacuna triple vírica

15/10/2009

Respuesta del Experto a ...

Reacciones adversas tras vacuna triple vírica

Pregunta

Tengo paciente de 6 años de edad con reacción vacunal de la triple viral a la semana con fiebre rinorrea dolor en la garganta que cedió con analgésicos dos días después dolor en rodilla y músculos posteriores de la pierna pregunta estos dolores pueden ser causa de reacción a la vacuna. Gracias.

Respuesta de José Antonio Navarro (15 de Octubre de 2009)

A los 6-12 días tras la vacunación con triple vírica se puede observar en el 5%-15% de los receptores una temperatura igual o superior a 39.4°C con una duración de 1 a 2 días aunque puede llegar a los 5 días. Este cuadro febril puede acompañarse de rinorrea y odinofagia, todo ello debido a la replicación del componente sarampionoso (1,2).

Debido al componente rubeólico pueden aparecer artralgias transitorias en el 0.5% de los vacunados que comienza a los 7-21 días tras la vacunación (3).

Referencias

(1) American Academy of Pediatrics. Measles. In: Pickering LK, ed. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2009:444-455. Available at: <http://aapredbook.aappublications.org/cgi/content/full/2009/1/3.77>.

(2) Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Atkinson W,

Wolfe S, Hamborsky J, McIntyre L, eds. 11th ed. Washington DC: Public Health Foundation, 2009. Disponible en: <http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/meas.pdf>

(3) American Academy of Pediatrics. Rubella. In: Pickering LK, ed. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2009:579-584. Available at: <http://aapredbook.aappublications.org/cgi/content/full/2009/1/3.116>.