

Segunda dosis de vacuna tras episodio de trombosis de senos venosos

03/06/2021

Respuesta del Experto a ...

Segunda dosis de vacuna tras episodio de trombosis de senos venosos

Pregunta

Buenos días.

Paciente mujer de 55 años sin antecedentes de interés que ha desarrollado trombosis de senos venosos transversos (también angioedema) posiblemente relacionados con la administración de la 1ª dosis de vacuna Vaxzevria (AZ) el pasado marzo. Inició síntomas a los 15 días pero el diagnóstico ha sido reciente y aún no se ha podido filiar con seguridad. Está hospitalizada en tratamiento con fondaparinux con buena evolución. ¿Puede ser vacunada con una vacuna ARNm (Pfizer/Moderna) para completar la inmunización?

Muchas gracias.

Respuesta de José Antonio Navarro (3 de Junio de 2021)

Buenos días.

Si el cuadro clínico que expone no cursó con trombocitopenia puede recibir una segunda dosis de Vaxzevria. En el caso de llevar asociada una trombocitopenia, la recomendación es la de administrar una segunda dosis de vacuna que no sea de vectores adenovíricos (mRNA) ⁽¹⁾.

Referencias

¹ GOV.UK. COVID-19: the green book, chapter 14a Coronavirus

(COVID-19) vaccination information for public health professionals.

<https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a>