

Vacuna de hepatitis B y contactos sexuales con portadores

30/08/2006

Respuesta del Experto a ...

Vacuna de hepatitis B y contactos sexuales con portadores

Pregunta

El caso es el siguiente: pareja sexual de portador crónico de la hepatitis B vacunada correctamente y control postvacunal a los pocos meses de la tercera dosis >10 mUI/ml. ¿ es pertinente seguir realizando controles postvacunales ? ¿ en qué situaciones? ¿ con qué periodicidad?

Gracias

Julio de la Puente
Hospital de Segovia

Respuesta del Dr. José Antonio Navarro Alonso (21 de marzo de 2003)

Un contacto sexual de un/a portador/a crónico de antígeno de superficie de la hepatitis B que ha recibido una serie de tres dosis de vacuna y cuyos marcadores (Anti HBs) tras la tercera dosis son superiores a 10 mIU/mL, se encuentra protegido frente a la enfermedad. Como la vacuna genera memoria inmunológica duradera y persiste la protección aún descendiendo los títulos por debajo de 10 mIU/mL, no está indicada la práctica de control periódico de marcadores, por lo menos, y hasta el momento, durante los 15 años tras la vacunación (1).

1. European Consensus Group on Hepatitis B Immunity. Are

booster immunisations needed for lifelong hepatitis B immunity?. Lancet 2000;355:561-565