## Vacuna de varicela en contactos de inmunudeprimidos

16/06/2011

Respuesta del Experto a ...

Vacuna de varicela en contactos de inmunudeprimidos.

## **Pregunta**

Buenos días. Tengo una paciente de 4 años diagnosticada recientemente de LLA y en tratamiento de consolidación. Tiene una hermana pequeña de 14 meses y me planteo vacunarla de varicela. Quisiera saber cuánto tiempo es necesario separarla de su hermana mayor (¿seis semanas? o ¿solo si aparecen lesiones postvacunales...?) que actualmente no está ingresada y si es aconsejable una pauta acelerada de vacunación o se puede poner la segunda dosis a os 3-4 años.

## Respuesta de José Antonio Navarro (16 de junio de 2011)

Al objeto de disponer de un cinturón de inmunes alrededor de la paciente es aconsejable chequear la inmunidad frente a la varicela en los convivientes. En el caso de la hermana de 14 meses debiera vacunarla ahora y repetir la dosis a partir de las 4 semanas (por ejemplo, a los 18 meses) para alcanzar precozmente una óptima protección. Debido al riesgo extremadamente bajo de transmisisón del virus vacunal a contactos no es necesario separarla de la paciente susceptible al menos que desarrolle lesiones cutáneas en cuyo caso se evitará el contacto hasta que se resuelvan (1).

## Referencias

1. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of Varicella.

Recommendations of the Advisory Committee on Immunization

Practices (ACIP). MMWR 2007;56(No. RR-4)