

Vacuna y embarazo

30/08/2006

Respuesta del Experto a ...

Vacuna y embarazo

Pregunta

¿Es necesario evitar el embarazo tras la vacuna contra la fiebre amarilla?. ¿Durante cuanto tiempo?

Elena Díez Álvarez
Centro de Salud

Responde el Dr. José Antonio Navarro (28 de julio de 2003)

No se ha establecido la seguridad de la vacuna frente a la fiebre amarilla durante el embarazo, por lo que la vacuna debiera administrarse solamente en el caso de que sea inevitable el viaje a una zona endémica y además existiera un alto riesgo de exposición. No obstante, la embarazada debe conocer que existe un riesgo hipotético aunque no se ha podido demostrar, en administraciones inadvertidas de vacuna, ningún daño en el feto.

Respecto al tiempo a transcurrir entre la administración de la vacuna frente a la fiebre amarilla y el embarazo, si aplicamos la regla general para las vacunas vivas (triple vírica y varicela), serían 4 semanas el tiempo aconsejable tras la vacunación para que no quedase embarazada.

1. Advisory Committee on Immunization Practices. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices and the American Academy of Family Physician. General Recommendations on Immunization. MMWR 2002;51(RR-2):19

2. Monath T. Yellow fever. In: Plotkin and Orenstein ed.

Vaccines. 3rd edition. w.B. Saunders Co. Philadelphia. 1999: 815-880

3. Advisory Committee on Immunization Practices. Yellow fever vaccine. MMWR 2002;51 (RR-17)1-10

4. Carreras F, Alonso M, Garrido P, Castillo O. Vacuna antiamarílica. En: Vacunaciones preventivas. Principios y aplicaciones. Salleras ed. Segunda edición. Masson. Barcelona. 2003:509-528