

La vacunación reduce la muerte súbita del lactante

25/03/2015

Científicos de la clínica universitaria Charité de Berlín han concluido que, cuanto más elevada es la tasa de vacunación contra enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos ferina, menor es la frecuencia de casos de muerte súbita del lactante. Los expertos han llegado a esta conclusión a partir de la evaluación de la información compilada durante varias décadas, según informó la Charité en un comunicado. En los últimos 40 años, la tasa de vacunación en Estados Unidos ha ido variando de acuerdo a las tendencias imperantes en la sociedad y también, aunque de forma proporcionalmente inversa, ha oscilado la cifra de casos de muerte súbita en lactantes. “Nuestra investigación muestra que las vacunas clásicas en edad de lactancia contra la tos ferina, la difteria, el tétanos, la polio o el *Haemophilus influenzae* no están relacionadas con un riesgo mayor de muerte súbita del lactante”, señaló Jacqueline Müller-Nordhorn, directora y portavoz del Berlin School of Public Health (BSPH). Según los científicos, cuyo estudio ha sido publicado en la revista especializada “BMC Pediatrics”, la tendencia es clara: cuando aumentan los índices de vacunación, caen los casos de muerte súbita del lactante.

[\[Más información\]](#)