

Vacunaciones y donación de sangre

03/07/2014

Respuesta del Experto a ...

Vacunaciones y donación de sangre

Pregunta

Me gustaría saber si después de vacunarse , hay algún intervalo de tiempo para donar sangre, y si lo hay, cuales son las vacunas que tienen intervalo y por que ?

Respuesta de José Antonio Navarro (3 de Julio de 2014)

Muchas gracias por su “muy amable” pregunta.

Según la American Red Cross y la PAHO se recomienda un intervalo de al menos 4 semanas entre la vacunación triple vírica, varicela y la vacuna de fiebre amarilla y la donación de sangre(1,2,3).

Respecto de la vacuna de hepatitis B se puede observar una antigenemia transitoria hasta 3 semanas después sin riesgo para el donante o para el receptor (4).

Referencias

1.American Red Cross. Eligibility Criteria. Immunization, Vaccination. Disponible en:

www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements/eligibility-criteria-alphabetical-listing

2.Pan American Health Organization. XVI Meeting of the Technical Advisory Group on Vaccine-preventable Diseases. Mexico City – November 3-5, 2004

3.Monath T. Exp Rev Vaccines 2012;11:427-448

4.Challapalli M et al. Pediatr Infect Dis J 1993;12:878-879