

Vacunas hipocomplementémicos

en

21/01/2013

Respuesta del Experto a ...

Vacunas en hipocomplementémicos

Pregunta

A raíz del diagnóstico de una niña de una hipocomplementemia, se ha hecho el estudio familiar:

– Padre: 36 años, C3 y C4 bajos. No ha pasado parotiditis. Estaría recomendada una dosis de Meningococo C Conjugada, una dosis de PnPS23 v y ¿una dosis de Triple Vírica? (entiendo que no es mucha inmunodepresión para contraindicar vacuna virus vivos, pero tengo duda).

– Madre: 36 años, C4 bajo. Una dosis de meningococo C y una de PnPS23V. Ha pasado todas las EPI.

– Hermana: 8 años, probable complemento bajo, en estudio. Vacunada con PnC7V. ¿Se recomienda una dosis de PnC13v y a los 2 meses una PnPS23V, o directamente sólo una dosis de PnPS23V?.

– Abuelo: 73 años, e inmunodeprimido con Imurel por Colitis Ulcerosa. C4 bajo. Una dosis de PnPS23V y ¿está indicada también la del Meningococo C conjugada?. Muchísimas gracias.

Respuesta de José Antonio Navarro (21 de enero de 2013)

– Padre. Debe de recibir MenCC, Hib, gripe y PnPS23. No tiene riesgo de padecimiento grave de parotiditis por su edad. Recibirá una dosis de TV si no tiene antecedentes de recepción previa de 1 dosis.

– Madre. Debe de recibir MenCC, Hib, gripe y PnPS23.

- Hermana. En principio 1 dosis de PnC13 y valorar recuerdo con PnPS23 según resultados del estudio.
- Abuelo. MenCC, gripe y PnPS23. Valorar Hib.