

El Infórmate



Vacunación en personas adultas con EII



¿Debo vacunarme?

¿Son seguras las vacunas para personas con tratamientos inmunosupresores?

Desliza para resolver todas tus dudas



Confederación ACCU
Crohn y Colitis Ulcerosa



Neumococo



Es una bacteria que habita en la nasofaringe que puede ocasionar infecciones respiratorias.

Si NO te administras
tratamiento inmunosupresor

**Se recomienda vacunación
a partir de los 65 años**

Si te administras
TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR



**Se recomienda vacunación
a cualquier edad**

Existen varias vacunas y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y la vacunación previa.
Consulta con tus profesionales de referencia.



Herpes zóster



También llamada **“culebrilla”** es la reactivación del virus de la varicela que se encuentra latente en el organismo.

Produce una erupción en la piel muy dolorosa y puede ocasionar complicaciones a largo plazo como la neuralgia postherpética.

Si NO te administras
tratamiento inmunosupresor

**Se recomienda vacunación
a partir de los 65 años**

Los rangos de edad incluidos pueden variar en función
de la Comunidad Autónoma.

Consulta con tus profesionales de referencia.





Herpes zóster



Si te administras
TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR



Si has presentado 2 o más episodios de herpes zoster, también se recomienda la vacunación

Con tratamiento anti
JAK se recomienda
vacunación a partir de
los 18 años

Con otros
inmunosupresores se
recomienda vacunación
a partir de los 50 años

Algunas Comunidades Autónomas incluyen la vacunación en personas con tratamientos inmunosupresores a partir de 18 años. Consulta con tus profesionales de referencia.





Hepatitis B



La hepatitis B es una enfermedad del hígado causada por un virus que **puede llegar a ser crónica**. Se puede transmitir a través del contacto con líquidos corporales infectados mediante contacto sexual o inyecciones sin garantías de seguridad. También puede transmitirse de la gestante al bebé en el parto.

Si NO te administras
tratamiento inmunosupresor

Si te administras
TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR



**Se recomienda
vacunación
si hay riesgo elevado de
exposición**



Triple vírica



Es una vacuna que nos protege frente a tres tipos de enfermedades infecciosas: **Sarampión, Rubeola y Parotiditis** (comúnmente conocida como “paperas”).

Si NO te administras
tratamiento inmunosupresor

**Se recomienda vacunación
en caso de no haber
pasado la enfermedad o
no haber recibido 2 dosis
de la vacuna**


Si te administras
TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR



**CONTRAINDICADA por
ser una vacuna de virus
vivos atenuados**



Varicela



Es una infección viral muy contagiosa que causa una erupción en la piel con picazón acompañada de fiebre y malestar.

Si NO te administras
tratamiento inmunosupresor

Si te administras
TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR



**Se recomienda vacunación
en caso de no haber
pasado la enfermedad o
no haber recibido 2 dosis
de la vacuna**

**CONTRAINDICADA por
ser una vacuna de virus
vivos atenuados**




Gripe



Infección vírica que ocasiona fiebre, tos, dolor muscular y malestar general, pudiendo generar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

Se recomienda vacunación anual

COVID-19



Enfermedad viral causada por el SARS-CoV-2, que puede provocar fiebre, tos, dificultad respiratoria y complicaciones graves, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas.

Se recomienda vacunación anual



El Infórmate



Bibliografía

Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Calendario común de vacunación e inmunización a lo largo de toda la vida: calendario recomendado año 2025. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Revisado por



Asociación
Española
de Vacunología



GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO
EN ENFERMEDAD DE CROHN Y
COLITIS ULCEROSA

www.geteccu.org



Grupo enfermero
de trabajo en EII
GETEII

Con la colaboración de

abbvie

Pfizer Lilly

*Las recomendaciones pueden variar en función de la comunidad autónoma. Consulta con tus profesionales de referencia.



Confederación ACCU
Crohn y Colitis Ulcerosa