Vacunas indicadas en personas con

COLITIS ULCEROSA

Asociación Española de Vacunología

Amplía información escanea QR



Gripe

Deberá recibir **1 dosis anual**



Covid-19

Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Hay casos en los que, según el tipo de tratamiento inmunosupresor que se reciba, habría que vacunar cada 3/6 meses.



Hepatitis B

Se recomienda vacunación si existe riesgo elevado de infección. El profesional sanitario le informará de manera específica. En caso de necesitarse, se realizará un estudio serológico previo.

Neumococo



Se recomienda esta vacuna en caso de recibir tratamiento inmunosupresor. Existen varios preparados de vacunas antineumocócicas y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de vacunación previos. Por tanto, consultar de manera específica

Herpes zóster

Precisarán **2 dosis** aquellas personas ≥18 años que reciben tratamiento con fármacos denominados anti-JAK, y en ≥50 años que reciben tratamiento con otros fármacos inmunosupresores.

Se recomienda revisar la vacunación de quienes convivan con pacientes con COLITIS ULCEROSA

Grupo de Trabajo Información para pacientes de la Asociación Española de Vacunología [09/2026]